

表 1264 HDL-C濃度(mg/dL) 治療方法別(透析患者全体)

治療方法	20未満	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析	644 (%)	13,327 (8.2)	39,366 (24.2)	43,706 (26.9)	31,574 (19.4)	18,067 (11.1)	8,806 (5.4)	3,897 (2.4)	1,773 (1.1)	1,530 (0.9)	162,690 (100.0)	71,014	233,704	48.28	16.32
血液透析濾過	164 (%)	3,702 (6.7)	12,018 (21.6)	14,509 (26.1)	11,318 (20.3)	7,058 (12.7)	3,738 (6.7)	1,823 (3.3)	769 (1.4)	564 (1.0)	55,663 (100.0)	19,136	74,799	50.22	16.72
血液濾過	4 (%)	7 (23.5)	3 (41.2)	1 (17.6)	2 (5.9)	1 (11.8)				17 (100.0)	2 (100.0)	19	37.00	12.49	
血液吸着透析	3 (%)	47 (4.5)	187 (18.1)	256 (24.7)	237 (22.9)	177 (17.1)	76 (7.3)	27 (2.6)	14 (1.4)	11 (1.1)	1,035 (100.0)	320	1,355	52.21	16.62
在宅血液透析	3 (%)	16 (3.9)	58 (14.1)	92 (22.3)	90 (21.8)	70 (17.0)	30 (7.3)	24 (5.8)	13 (3.2)	16 (3.9)	412 (100.0)	205	617	56.80	20.59
腹膜透析	15 (%)	289 (7.1)	921 (22.6)	1,029 (25.3)	784 (19.2)	521 (12.8)	244 (6.0)	149 (3.7)	67 (1.6)	56 (1.4)	4,075 (100.0)	4,540	8,615	50.31	18.13
合計	829 (%)	17,385 (7.8)	52,557 (23.5)	59,595 (26.6)	44,004 (19.7)	25,895 (11.6)	12,894 (5.8)	5,920 (2.6)	2,636 (1.2)	2,177 (1.0)	223,892 (100.0)	95,217	319,109	48.83	16.49
記載なし															
総計	829 (%)	17,385 (7.8)	52,557 (23.5)	59,595 (26.6)	44,004 (19.7)	25,895 (11.6)	12,894 (5.8)	5,920 (2.6)	2,636 (1.2)	2,177 (1.0)	223,892 (100.0)	95,217	319,109	48.83	16.49

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4510##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査