

表 1267 HDL-C濃度(mg/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	20未満	20 ～	30 ～	40 ～	50 ～	60 ～	70 ～	80 ～	90 ～	100 ～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	616	13,798	38,599	39,514	26,563	14,163	6,482	2,880	1,257	1,056	144,928	60,995	205,923	46.68	15.67
(%)	(0.4)	(9.5)	(26.6)	(27.3)	(18.3)	(9.8)	(4.5)	(2.0)	(0.9)	(0.7)	(100.0)				
女性	213	3,587	13,958	20,081	17,441	11,732	6,412	3,040	1,379	1,121	78,964	34,221	113,185	52.78	17.22
(%)	(0.3)	(4.5)	(17.7)	(25.4)	(22.1)	(14.9)	(8.1)	(3.8)	(1.7)	(1.4)	(100.0)				
合計	829	17,385	52,557	59,595	44,004	25,895	12,894	5,920	2,636	2,177	223,892	95,216	319,108	48.83	16.49
(%)	(0.4)	(7.8)	(23.5)	(26.6)	(19.7)	(11.6)	(5.8)	(2.6)	(1.2)	(1.0)	(100.0)				
記載なし												1	1		
(%)															
総計	829	17,385	52,557	59,595	44,004	25,895	12,894	5,920	2,636	2,177	223,892	95,217	319,109	48.83	16.49
(%)	(0.4)	(7.8)	(23.5)	(26.6)	(19.7)	(11.6)	(5.8)	(2.6)	(1.2)	(1.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4513##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査