

表 1270 HDL-C濃度(mg/dL) 原疾患別(透析患者全体)

原疾患	20未満	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	171 (%) (0.3)	3,386 (5.2)	12,542 (19.2)	17,039 (26.1)	14,017 (21.4)	9,213 (14.1)	4,910 (7.5)	2,321 (3.5)	1,028 (1.6)	779 (1.2)	65,406 (100.0)	26,377	91,783	51.72	16.85
慢性腎盂腎炎	7 (%) (0.4)	97 (4.9)	306 (15.4)	521 (26.2)	449 (22.6)	317 (16.0)	148 (7.5)	84 (4.2)	25 (1.3)	31 (1.6)	1,985 (100.0)	911	2,896	53.00	17.14
急速進行性糸球体腎炎	2 (%) (0.1)	52 (2.9)	268 (15.0)	393 (22.0)	411 (23.0)	299 (16.8)	178 (10.0)	89 (5.0)	45 (2.5)	47 (2.6)	1,784 (100.0)	754	2,538	56.11	18.29
妊娠腎/妊娠中毒症	24 (%) (2.2)	162 (14.8)	224 (20.4)	267 (24.3)	199 (18.1)	105 (9.6)	76 (6.9)	27 (2.5)	13 (1.2)	1,097 (100.0)	386	1,483	56.29	16.98	
その他の分類不能の腎炎	2 (%) (0.2)	40 (3.8)	211 (20.0)	254 (24.0)	229 (21.7)	159 (15.0)	89 (8.4)	45 (4.3)	18 (1.7)	10 (0.9)	1,057 (100.0)	397	1,454	52.54	16.51
多発性囊胞腎	24 (%) (0.3)	422 (5.1)	1,587 (19.3)	2,218 (26.9)	1,906 (23.1)	1,160 (14.1)	550 (6.7)	211 (2.6)	93 (1.1)	65 (0.8)	8,236 (100.0)	3,235	11,471	50.75	15.63
腎硬化症	81 (%) (0.4)	1,504 (6.8)	5,036 (22.7)	6,277 (28.2)	4,525 (20.4)	2,572 (11.6)	1,262 (5.7)	542 (2.4)	251 (1.1)	183 (0.8)	22,233 (100.0)	9,417	31,650	48.96	15.98
悪性高血圧	6 (%) (0.3)	110 (5.7)	426 (22.2)	538 (28.0)	383 (19.9)	238 (12.4)	121 (6.3)	46 (2.4)	24 (1.2)	30 (1.6)	1,922 (100.0)	799	2,721	50.16	17.00
糖尿病性腎症	418 (%) (0.5)	9,724 (11.3)	24,966 (28.9)	23,382 (27.1)	14,718 (17.0)	7,345 (8.5)	3,215 (3.7)	1,432 (1.7)	606 (0.7)	601 (0.7)	86,407 (100.0)	37,250	123,657	45.26	15.39
SLE腎炎	5 (%) (0.3)	49 (3.1)	219 (13.8)	339 (21.4)	352 (22.3)	266 (16.8)	180 (11.4)	90 (5.7)	50 (3.2)	32 (2.0)	1,582 (100.0)	640	2,222	56.64	18.59
アミロイド腎	1 (%) (0.3)	10 (3.3)	46 (15.1)	62 (20.4)	71 (23.4)	47 (15.5)	33 (10.9)	15 (4.9)	15 (4.9)	4 (1.3)	304 (100.0)	134	438	56.34	18.84
痛風腎	2 (%) (0.3)	62 (8.0)	154 (19.9)	210 (27.2)	153 (19.8)	96 (12.4)	48 (6.2)	27 (3.5)	11 (1.4)	10 (1.3)	773 (100.0)	283	1,056	50.02	17.34
先天性代謝異常による腎不全	1 (%) (0.5)	6 (3.1)	33 (17.2)	52 (27.1)	44 (22.9)	27 (14.1)	11 (5.7)	5 (2.6)	5 (2.6)	8 (4.2)	192 (100.0)	89	281	54.30	19.77
腎・尿路結核	7 (%) (5.8)	18 (14.9)	29 (24.0)	28 (23.1)	19 (15.7)	9 (7.4)	5 (4.1)	5 (4.1)	1 (0.8)	121 (100.0)	47	168	53.53	17.39	
腎・尿路結石	22 (%) (5.6)	80 (20.3)	107 (27.2)	84 (21.3)	43 (10.9)	33 (8.4)	14 (3.6)	4 (1.0)	7 (1.8)	394 (100.0)	184	578	51.01	17.12	
腎・尿路腫瘍	4 (%) (0.6)	51 (7.4)	161 (23.5)	181 (26.4)	153 (22.3)	70 (10.2)	35 (5.1)	16 (2.3)	8 (1.2)	7 (1.0)	686 (100.0)	273	959	48.68	15.90
閉塞性尿路障害	16 (%) (3.0)	103 (19.0)	136 (25.1)	133 (24.6)	72 (13.3)	43 (7.9)	20 (3.7)	7 (1.3)	11 (2.0)	541 (100.0)	202	743	53.22	18.00	
骨髄腫	13 (%) (6.1)	34 (15.9)	58 (27.1)	46 (21.5)	32 (15.0)	20 (9.3)	8 (3.7)	1 (0.5)	2 (0.9)	214 (100.0)	109	323	51.64	15.84	
腎形成不全	1 (%) (0.2)	20 (4.2)	85 (17.9)	132 (27.8)	91 (19.2)	63 (13.3)	55 (11.6)	13 (2.7)	8 (1.7)	6 (1.3)	474 (100.0)	190	664	52.97	18.12
不明	76 (%) (0.4)	1,335 (6.3)	4,611 (21.8)	5,594 (26.4)	4,375 (20.7)	2,689 (12.7)	1,347 (6.4)	620 (2.9)	287 (1.4)	233 (1.1)	21,167 (100.0)	10,245	31,412	50.06	16.66
再導入	2 (%) (0.1)	72 (4.7)	304 (19.8)	382 (24.9)	353 (23.0)	202 (13.2)	123 (8.0)	50 (3.3)	28 (1.8)	20 (1.3)	1,536 (100.0)	638	2,174	51.96	17.04
その他	26 (%) (0.4)	363 (6.3)	1,205 (20.8)	1,467 (25.4)	1,216 (21.0)	767 (13.3)	379 (6.6)	191 (3.3)	90 (1.6)	77 (1.3)	5,781 (100.0)	2,657	8,438	50.83	17.32
合計	829 (%) (0.4)	17,385 (7.8)	52,557 (23.5)	59,595 (26.6)	44,004 (19.7)	25,895 (11.6)	12,894 (5.8)	5,920 (2.6)	2,636 (1.2)	2,177 (1.0)	223,892 (100.0)	95,217	319,109	48.83	16.49
記載なし															
総計	829 (%) (0.4)	17,385 (7.8)	52,557 (23.5)	59,595 (26.6)	44,004 (19.7)	25,895 (11.6)	12,894 (5.8)	5,920 (2.6)	2,636 (1.2)	2,177 (1.0)	223,892 (100.0)	95,217	319,109	48.83	16.49

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4516#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査