

表 1277 HDL-C濃度(mg/dL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 性別          | 20未満         | 20～            | 30～              | 40～              | 50～              | 60～             | 70～            | 80～            | 90～          | 100～         | 合計                | 記載なし   | 総計     | 平均    | 標準偏差  |
|-------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|
| 男性<br>(%)   | 123<br>(0.3) | 2,937<br>(8.3) | 8,817<br>(25.0)  | 9,661<br>(27.4)  | 6,753<br>(19.2)  | 3,719<br>(10.6) | 1,830<br>(5.2) | 833<br>(2.4)   | 327<br>(0.9) | 246<br>(0.7) | 35,246<br>(100.0) | 8,899  | 44,145 | 47.72 | 15.74 |
| 女性<br>(%)   | 32<br>(0.2)  | 674<br>(3.5)   | 2,914<br>(15.3)  | 4,543<br>(23.8)  | 4,299<br>(22.5)  | 3,162<br>(16.6) | 1,802<br>(9.4) | 944<br>(4.9)   | 423<br>(2.2) | 293<br>(1.5) | 19,086<br>(100.0) | 5,143  | 24,229 | 54.76 | 17.38 |
| 合計<br>(%)   | 155<br>(0.3) | 3,611<br>(6.6) | 11,731<br>(21.6) | 14,204<br>(26.1) | 11,052<br>(20.3) | 6,881<br>(12.7) | 3,632<br>(6.7) | 1,777<br>(3.3) | 750<br>(1.4) | 539<br>(1.0) | 54,332<br>(100.0) | 14,042 | 68,374 | 50.19 | 16.67 |
| 記載なし<br>(%) |              |                |                  |                  |                  |                 |                |                |              |              |                   |        |        |       |       |
| 総計<br>(%)   | 155<br>(0.3) | 3,611<br>(6.6) | 11,731<br>(21.6) | 14,204<br>(26.1) | 11,052<br>(20.3) | 6,881<br>(12.7) | 3,632<br>(6.7) | 1,777<br>(3.3) | 750<br>(1.4) | 539<br>(1.0) | 54,332<br>(100.0) | 14,042 | 68,374 | 50.19 | 16.67 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4530##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査