

表 1280 HDL-C濃度(mg/dL) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	20未満	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	37 (%)	801 (4.5)	3,064 (17.0)	4,459 (24.8)	3,982 (22.2)	2,762 (15.4)	1,532 (8.5)	776 (4.3)	336 (1.9)	223 (1.2)	17,972 (100.0)	4,416	22,388	53.19	16.91
慢性腎盂腎炎	1 (%)	18 (0.2)	74 (3.6)	130 (15.0)	97 (26.3)	100 (19.6)	36 (20.2)	24 (7.3)	5 (4.9)	9 (1.0)	494 (1.8)	133	627	54.34	17.35
急速進行性糸球体腎炎	12 (%)	46 (3.1)	84 (11.9)	82 (21.7)	70 (21.2)	47 (18.1)	26 (12.1)	9 (6.7)	11 (2.3)	387 (2.8)	97 (100.0)	484	57.88	18.30	
妊娠腎/妊娠中毒症	8 (%)	52 (2.2)	64 (14.1)	90 (17.3)	70 (24.3)	44 (18.9)	30 (11.9)	12 (8.1)	12 (3.2)	370 (100.0)	89	459	57.28	16.38	
その他の分類不能の腎炎	1 (%)	13 (0.4)	50 (4.7)	60 (18.0)	47 (21.6)	39 (16.9)	38 (14.0)	18 (13.7)	8 (6.5)	4 (2.9)	278 (1.4)	77	355	55.39	19.00
多発性囊胞腎	1 (%)	107 (0.0)	338 (5.2)	551 (16.3)	513 (26.6)	309 (24.7)	153 (14.9)	65 (7.4)	18 (3.1)	19 (0.9)	2,074 (0.9)	495	2,569	51.73	15.34
腎硬化症	14 (%)	275 (0.3)	1,016 (5.8)	1,328 (21.5)	974 (28.1)	572 (20.6)	290 (12.1)	150 (6.1)	67 (3.2)	36 (1.4)	4,722 (0.8)	1,174	5,896	49.94	16.23
悪性高血圧	26 (%)	81 (5.9)	117 (18.5)	92 (26.7)	67 (21.0)	32 (15.3)	12 (7.3)	6 (2.7)	6 (1.4)	6 (1.4)	439 (100.0)	116	555	51.61	16.91
糖尿病性腎症	84 (%)	1,936 (0.4)	5,462 (10.0)	5,306 (28.2)	3,404 (27.4)	1,720 (17.6)	781 (8.9)	369 (4.0)	153 (1.9)	124 (0.8)	19,339 (0.6)	5,177	24,516	45.94	15.43
SLE腎炎	13 (%)	56 (3.1)	84 (13.3)	98 (20.0)	73 (23.3)	52 (17.4)	23 (12.4)	10 (5.5)	11 (2.4)	11 (2.6)	420 (100.0)	117	537	57.25	18.02
アミロイド腎	2 (%)	8 (2.7)	18 (10.8)	16 (24.3)	10 (21.6)	13 (13.5)	5 (17.6)	5 (6.8)	2 (2.7)	2 (1.0)	74 (100.0)	24	98	56.74	16.62
痛風腎	1 (%)	12 (0.5)	38 (6.3)	50 (19.9)	39 (26.2)	23 (20.4)	17 (12.0)	8 (8.9)	3 (4.2)	3 (1.6)	191 (100.0)	36	227	50.59	16.26
先天性代謝異常による腎不全	1 (%)	10 (1.9)	12 (18.5)	15 (22.2)	5 (27.8)	4 (9.3)	2 (7.4)	2 (3.7)	3 (3.7)	3 (5.6)	54 (100.0)	19	73	56.39	20.06
腎・尿路結核	3 (%)	7 (8.6)	8 (20.0)	6 (22.9)	4 (17.1)	4 (11.4)	3 (8.6)	3 (8.6)	1 (2.9)	1 (100.0)	35 (100.0)	9	44	61.26	19.46
腎・尿路結石	4 (%)	16 (4.8)	20 (19.0)	16 (23.8)	10 (19.0)	11 (11.9)	5 (13.1)	1 (6.0)	1 (1.2)	1 (1.2)	84 (100.0)	29	113	53.32	16.45
腎・尿路腫瘍	8 (%)	32 (5.2)	46 (20.8)	39 (29.9)	13 (25.3)	8 (8.4)	4 (5.2)	3 (2.6)	1 (1.9)	1 (0.6)	154 (100.0)	36	190	49.76	15.40
閉塞性尿路障害	5 (%)	19 (3.9)	32 (14.7)	28 (24.8)	21 (21.7)	15 (16.3)	8 (11.6)	1 (6.2)	1 (0.8)	1 (100.0)	129 (100.0)	22	151	53.89	15.66
骨髄腫	1 (%)	3 (3.4)	12 (10.3)	3 (41.4)	4 (10.3)	4 (13.8)	2 (13.8)	2 (6.9)	2 (6.9)	2 (100.0)	8 (100.0)	8	37	52.03	15.73
腎形成不全	1 (%)	25 (0.7)	38 (2.8)	24 (17.2)	20 (26.2)	20 (16.6)	20 (13.8)	6 (13.8)	5 (4.1)	2 (3.4)	145 (1.4)	26	171	55.76	21.05
不明	11 (%)	281 (5.5)	987 (19.5)	1,308 (25.8)	1,062 (20.9)	719 (14.2)	386 (7.6)	183 (3.6)	74 (1.5)	60 (1.2)	5,071 (100.0)	1,460	6,531	51.58	16.91
再導入	21 (%)	84 (4.2)	120 (16.6)	133 (23.8)	68 (26.3)	46 (13.5)	19 (9.1)	6 (3.8)	8 (1.2)	8 (1.6)	505 (100.0)	128	633	53.12	17.10
その他	4 (%)	63 (0.3)	267 (4.6)	358 (19.5)	290 (26.2)	200 (21.2)	99 (14.6)	39 (7.2)	26 (2.9)	20 (1.9)	1,366 (1.5)	354	1,720	51.96	17.12
合計	155 (%)	3,611 (6.6)	11,731 (21.6)	14,204 (26.1)	11,052 (20.3)	6,881 (12.7)	3,632 (6.7)	1,777 (3.3)	750 (1.4)	539 (1.0)	54,332 (100.0)	14,042	68,374	50.19	16.67
記載なし															
総計	155 (%)	3,611 (6.6)	11,731 (21.6)	14,204 (26.1)	11,052 (20.3)	6,881 (12.7)	3,632 (6.7)	1,777 (3.3)	750 (1.4)	539 (1.0)	54,332 (100.0)	14,042	68,374	50.19	16.67

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4533#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査