

表 1282 HDL-C濃度(mg/dL) 性別 (腹膜透析患者)

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	13 (0.5)	238 (8.9)	675 (25.3)	710 (26.7)	479 (18.0)	290 (10.9)	124 (4.7)	70 (2.6)	35 (1.3)	29 (1.1)	2,663 (100.0)	2,939	5,602	47.92	17.29
女性 (%)	2 (0.1)	51 (3.6)	246 (17.4)	319 (22.6)	305 (21.6)	231 (16.4)	120 (8.5)	79 (5.6)	32 (2.3)	27 (1.9)	1,412 (100.0)	1,601	3,013	54.81	18.81
合計 (%)	15 (0.4)	289 (7.1)	921 (22.6)	1,029 (25.3)	784 (19.2)	521 (12.8)	244 (6.0)	149 (3.7)	67 (1.6)	56 (1.4)	4,075 (100.0)	4,540	8,615	50.31	18.13
記載なし (%)															
総計 (%)	15 (0.4)	289 (7.1)	921 (22.6)	1,029 (25.3)	784 (19.2)	521 (12.8)	244 (6.0)	149 (3.7)	67 (1.6)	56 (1.4)	4,075 (100.0)	4,540	8,615	50.31	18.13

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4540##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査