

表 1284 HDL-C濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	20未満	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	5 (%)	90 (5.5)	363 (22.1)	403 (24.5)	333 (20.2)	208 (12.6)	116 (7.0)	72 (4.4)	33 (2.0)	23 (1.4)	1,646 (100.0)	1,972	3,618	51.64	18.53
2年~	6 (%)	115 (8.1)	303 (21.4)	393 (27.8)	246 (17.4)	188 (13.3)	76 (5.4)	50 (3.5)	22 (1.6)	17 (1.2)	1,416 (100.0)	1,568	2,984	49.55	17.63
5年~	3 (%)	61 (7.8)	189 (24.0)	182 (23.1)	159 (20.2)	100 (12.7)	41 (5.2)	26 (3.3)	11 (1.4)	15 (1.9)	787 (100.0)	788	1,575	50.20	18.89
10年~	18 (%)	49 (11.7)	31 (31.8)	27 (20.1)	17 (17.5)	17 (11.0)	9 (5.8)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	154 (100.0)	135	289	45.66	15.18
15年~	1 (%)	3 (2.2)	9 (6.7)	10 (20.0)	17 (22.2)	4 (37.8)	1 (8.9)	1 (2.2)			45 (100.0)	40	85	46.69	12.51
20年~	1 (%)	5 (6.7)	5 (33.3)	1 (33.3)	1 (6.7)	2 (13.3)	1 (13.3)	1 (6.7)			15 (100.0)	13	28	45.53	12.67
25年~		2 (33.3)	1 (66.7)	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)					3 (100.0)	6	9	44.00	4.36
30年~											4 (100.0)	2	6	51.00	13.59
35年~		1 (100.0)									1 (100.0)	1	1	38.00	
40年~		1 (100.0)									1 (100.0)	1	2	38.00	
合計	15 (%)	288 (7.1)	921 (22.6)	1,028 (25.2)	784 (19.3)	520 (12.8)	244 (6.0)	149 (3.7)	67 (1.6)	56 (1.4)	4,072 (100.0)	4,525	8,597	50.32	18.13
不明		1 (33.3)		1 (33.3)		1 (33.3)					3 (100.0)	15	18	44.00	17.35
記載なし															
総計	15 (%)	289 (7.1)	921 (22.6)	1,029 (25.3)	784 (19.2)	521 (12.8)	244 (6.0)	149 (3.7)	67 (1.6)	56 (1.4)	4,075 (100.0)	4,540	8,615	50.31	18.13
平均	3.60	3.60	3.45	3.14	3.23	3.08	2.74	2.34	2.34	2.96	3.19	2.88	3.03		
標準偏差	4.07	3.42	4.04	3.66	3.75	3.45	3.21	2.45	2.48	2.79	3.65	3.39	3.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4542##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査