

表 1285 HDL-C濃度(mg/dL) 原疾患別 (腹膜透析患者)

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	3 (0.2)	79 (6.0)	267 (20.2)	318 (24.1)	276 (20.9)	177 (13.4)	93 (7.0)	57 (4.3)	26 (2.0)	24 (1.8)	1,320 (100.0)	1,346	2,666	52.21	18.88
慢性腎盂腎炎 (%)		6 (12.0)	3 (6.0)	11 (22.0)	8 (16.0)	9 (18.0)	6 (12.0)	5 (10.0)	1 (2.0)	1 (2.0)	50 (100.0)	47	97	56.58	19.40
急速進行性糸球体腎炎 (%)			4 (12.9)	7 (22.6)	6 (19.4)	9 (29.0)	2 (6.5)	2 (6.5)	1 (3.2)		31 (100.0)	30	61	56.52	16.23
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)			3 (25.0)	5 (41.7)	3 (25.0)	1 (8.3)					12 (100.0)	12	24	46.17	8.49
その他の分類不能の腎炎 (%)		1 (2.9)	6 (17.1)	11 (31.4)	4 (11.4)	9 (25.7)	2 (5.7)	1 (2.9)	1 (2.9)		35 (100.0)	40	75	51.97	14.79
多発性嚢胞腎 (%)		4 (3.2)	17 (13.7)	24 (19.4)	35 (28.2)	16 (12.9)	15 (12.1)	5 (4.0)	5 (4.0)	3 (2.4)	124 (100.0)	148	272	56.65	18.70
腎硬化症 (%)	2 (0.4)	23 (4.3)	119 (22.1)	140 (26.0)	112 (20.8)	73 (13.5)	36 (6.7)	22 (4.1)	5 (0.9)	7 (1.3)	539 (100.0)	567	1,106	51.20	16.98
悪性高血圧 (%)		4 (7.8)	8 (15.7)	15 (29.4)	6 (11.8)	11 (21.6)	5 (9.8)		1 (2.0)	1 (2.0)	51 (100.0)	55	106	52.20	18.37
糖尿病性腎症 (%)	7 (0.5)	139 (10.8)	360 (28.1)	337 (26.3)	217 (16.9)	122 (9.5)	46 (3.6)	25 (2.0)	16 (1.2)	13 (1.0)	1,282 (100.0)	1,464	2,746	46.31	17.25
SLE腎炎 (%)	2 (7.7)	1 (3.8)	4 (15.4)	5 (19.2)	1 (3.8)	7 (26.9)	2 (7.7)	2 (7.7)	1 (3.8)	1 (3.8)	26 (100.0)	29	55	56.96	23.61
アミロイド腎 (%)		1 (12.5)	3 (37.5)		2 (25.0)			2 (25.0)			8 (100.0)	8	16	51.38	23.29
痛風腎 (%)		2 (14.3)	1 (7.1)	4 (28.6)	2 (14.3)	4 (28.6)	1 (7.1)				14 (100.0)	9	23	49.71	14.13
先天性代謝異常による腎不全 (%)				1 (16.7)	2 (33.3)	3 (50.0)					6 (100.0)	11	17	57.50	8.64
腎・尿路結核 (%)												1	1		
腎・尿路結石 (%)		1 (10.0)	2 (20.0)	3 (30.0)			1 (10.0)	3 (30.0)			10 (100.0)	11	21	55.00	22.03
腎・尿路腫瘍 (%)		1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)							5 (100.0)	7	12	37.00	5.15
閉塞性尿路障害 (%)			2 (22.2)	4 (44.4)	2 (22.2)		1 (11.1)				9 (100.0)	11	20	47.67	11.94
骨髄腫 (%)			1 (25.0)		3 (75.0)						4 (100.0)	3	7	49.50	13.23
腎形成不全 (%)		1 (7.1)	2 (14.3)	4 (28.6)	2 (14.3)	4 (28.6)			1 (7.1)		14 (100.0)	51	65	52.79	17.56
不明 (%)	1 (0.2)	21 (5.2)	89 (22.2)	101 (25.2)	84 (20.9)	51 (12.7)	25 (6.2)	18 (4.5)	7 (1.7)	4 (1.0)	401 (100.0)	488	889	50.89	17.85
再導入 (%)		1 (2.8)	7 (19.4)	8 (22.2)	4 (11.1)	10 (27.8)	3 (8.3)	1 (2.8)	1 (2.8)	1 (2.8)	36 (100.0)	29	65	55.72	18.46
その他 (%)		4 (4.1)	21 (21.4)	29 (29.6)	15 (15.3)	15 (15.3)	6 (6.1)	6 (6.1)	1 (1.0)	1 (1.0)	98 (100.0)	173	271	51.54	17.37
合計 (%)	15 (0.4)	289 (7.1)	921 (22.6)	1,029 (25.3)	784 (19.2)	521 (12.8)	244 (6.0)	149 (3.7)	67 (1.6)	56 (1.4)	4,075 (100.0)	4,540	8,615	50.31	18.13
記載なし (%)															
総計 (%)	15 (0.4)	289 (7.1)	921 (22.6)	1,029 (25.3)	784 (19.2)	521 (12.8)	244 (6.0)	149 (3.7)	67 (1.6)	56 (1.4)	4,075 (100.0)	4,540	8,615	50.31	18.13

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4543##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査