

表 1287 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 治療方法別 (透析患者全体)

治療方法	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	2,660 (1.9)	13,513 (9.5)	29,825 (21.0)	35,280 (24.8)	28,272 (19.9)	17,331 (12.2)	8,873 (6.2)	3,908 (2.7)	1,515 (1.1)	1,033 (0.7)	142,210 (100.0)	91,494	233,704	107.19	33.70
血液透析濾過 (%)	836 (1.7)	4,246 (8.7)	9,910 (20.4)	12,008 (24.7)	10,044 (20.7)	6,201 (12.8)	3,201 (6.6)	1,310 (2.7)	541 (1.1)	284 (0.6)	48,581 (100.0)	26,218	74,799	108.11	33.15
血液濾過 (%)		3 (17.6)	1 (5.9)	2 (11.8)	6 (35.3)	3 (17.6)	2 (11.8)				17 (100.0)	2	19	111.59	30.75
血液吸着透析 (%)	13 (1.4)	72 (7.6)	179 (18.9)	213 (22.5)	214 (22.6)	125 (13.2)	76 (8.0)	34 (3.6)	11 (1.2)	8 (0.8)	945 (100.0)	410	1,355	111.29	33.40
在宅血液透析 (%)	5 (1.4)	15 (4.1)	34 (9.3)	88 (24.0)	77 (21.0)	73 (19.9)	44 (12.0)	17 (4.6)	7 (1.9)	7 (1.9)	367 (100.0)	250	617	122.07	35.49
腹膜透析 (%)	24 (0.7)	122 (3.5)	390 (11.2)	707 (20.3)	776 (22.3)	625 (17.9)	407 (11.7)	255 (7.3)	89 (2.6)	92 (2.6)	3,487 (100.0)	5,128	8,615	126.08	38.53
合計 (%)	3,538 (1.8)	17,971 (9.2)	40,339 (20.6)	48,298 (24.7)	39,389 (20.1)	24,358 (12.5)	12,603 (6.4)	5,524 (2.8)	2,163 (1.1)	1,424 (0.7)	195,607 (100.0)	123,502	319,109	107.80	33.76
記載なし (%)															
総計 (%)	3,538 (1.8)	17,971 (9.2)	40,339 (20.6)	48,298 (24.7)	39,389 (20.1)	24,358 (12.5)	12,603 (6.4)	5,524 (2.8)	2,163 (1.1)	1,424 (0.7)	195,607 (100.0)	123,502	319,109	107.80	33.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4610##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査