

表 1290 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	50未満	50~	70~	90~	110~	130~	150~	170~	190~	210~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	2,842 (2.2)	14,125 (11.2)	29,162 (23.0)	31,963 (25.3)	23,835 (18.8)	13,485 (10.7)	6,628 (5.2)	2,769 (2.2)	1,062 (0.8)	652 (0.5)	126,523 (100.0)	79,400	205,923	103.49	32.64
女性 (%)	696 (1.0)	3,846 (5.6)	11,177 (16.2)	16,335 (23.6)	15,554 (22.5)	10,873 (15.7)	5,975 (8.6)	2,755 (4.0)	1,101 (1.6)	772 (1.1)	69,084 (100.0)	44,101	113,185	115.71	34.34
合計 (%)	3,538 (1.8)	17,971 (9.2)	40,339 (20.6)	48,298 (24.7)	39,389 (20.1)	24,358 (12.5)	12,603 (6.4)	5,524 (2.8)	2,163 (1.1)	1,424 (0.7)	195,607 (100.0)	123,501	319,108	107.80	33.76
記載なし (%)												1	1		
総計 (%)	3,538 (1.8)	17,971 (9.2)	40,339 (20.6)	48,298 (24.7)	39,389 (20.1)	24,358 (12.5)	12,603 (6.4)	5,524 (2.8)	2,163 (1.1)	1,424 (0.7)	195,607 (100.0)	123,502	319,109	107.80	33.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4613##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査