

表 1295 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	2,045 (2.3)	10,274 (11.6)	20,694 (23.4)	22,459 (25.3)	16,504 (18.6)	9,136 (10.3)	4,471 (5.0)	1,896 (2.1)	691 (0.8)	448 (0.5)	88,618 (100.0)	46,832	135,450	102.82	32.47
女性 (%)	500 (1.0)	2,793 (5.8)	8,049 (16.7)	11,531 (23.9)	10,697 (22.2)	7,500 (15.5)	4,062 (8.4)	1,833 (3.8)	752 (1.6)	520 (1.1)	48,237 (100.0)	25,848	74,085	114.97	34.26
合計 (%)	2,545 (1.9)	13,067 (9.5)	28,743 (21.0)	33,990 (24.8)	27,201 (19.9)	16,636 (12.2)	8,533 (6.2)	3,729 (2.7)	1,443 (1.1)	968 (0.7)	136,855 (100.0)	72,680	209,535	107.10	33.62
記載なし (%)												1	1		
総計 (%)	2,545 (1.9)	13,067 (9.5)	28,743 (21.0)	33,990 (24.8)	27,201 (19.9)	16,636 (12.2)	8,533 (6.2)	3,729 (2.7)	1,443 (1.1)	968 (0.7)	136,855 (100.0)	72,681	209,536	107.10	33.62

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4620##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査