

表 1296 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			2 (100.0)								2 (100.0)	3	5	73.50	3.54
15歳～ (%)	6 (1.9)	43 (13.7)	73 (23.2)	80 (25.4)	58 (18.4)	26 (8.3)	20 (6.3)	4 (1.3)	3 (1.0)	2 (0.6)	315 (100.0)	181	496	101.87	34.17
30歳～ (%)	74 (1.4)	413 (8.0)	950 (18.3)	1,231 (23.7)	1,127 (21.7)	694 (13.4)	400 (7.7)	155 (3.0)	75 (1.4)	65 (1.3)	5,184 (100.0)	2,630	7,814	111.70	35.04
45歳～ (%)	367 (1.6)	1,840 (8.1)	4,100 (18.0)	5,381 (23.7)	4,609 (20.3)	3,182 (14.0)	1,829 (8.0)	851 (3.7)	341 (1.5)	226 (1.0)	22,726 (100.0)	11,766	34,492	112.02	35.26
60歳～ (%)	1,147 (1.9)	5,689 (9.4)	12,488 (20.6)	14,813 (24.5)	12,150 (20.1)	7,536 (12.4)	3,889 (6.4)	1,737 (2.9)	644 (1.1)	442 (0.7)	60,535 (100.0)	31,847	92,382	107.63	33.86
75歳～ (%)	896 (2.0)	4,788 (10.6)	10,451 (23.1)	11,701 (25.8)	8,764 (19.3)	4,928 (10.9)	2,293 (5.1)	937 (2.1)	357 (0.8)	224 (0.5)	45,339 (100.0)	24,685	70,024	103.79	32.02
90歳～ (%)	55 (2.0)	294 (10.7)	679 (24.7)	784 (28.5)	493 (17.9)	270 (9.8)	102 (3.7)	45 (1.6)	23 (0.8)	9 (0.3)	2,754 (100.0)	1,567	4,321	101.28	30.36
合計 (%)	2,545 (1.9)	13,067 (9.5)	28,743 (21.0)	33,990 (24.8)	27,201 (19.9)	16,636 (12.2)	8,533 (6.2)	3,729 (2.7)	1,443 (1.1)	968 (0.7)	136,855 (100.0)	72,679	209,534	107.10	33.62
不明 (%)															
記載なし (%)												2	2		
総計 (%)	2,545 (1.9)	13,067 (9.5)	28,743 (21.0)	33,990 (24.8)	27,201 (19.9)	16,636 (12.2)	8,533 (6.2)	3,729 (2.7)	1,443 (1.1)	968 (0.7)	136,855 (100.0)	72,681	209,536	107.10	33.62
平均	69.74	69.97	69.86	69.28	68.51	67.76	66.64	66.45	66.12	65.13	68.83	69.10	68.93		
標準偏差	11.71	12.05	12.12	12.26	12.31	12.20	12.31	12.02	12.57	12.79	12.26	12.26	12.26		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4621##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査