

表 1300 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	50未満	50~	70~	90~	110~	130~	150~	170~	190~	210~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	668 (2.2)	3,276 (10.6)	7,098 (23.1)	7,777 (25.3)	5,913 (19.2)	3,394 (11.0)	1,629 (5.3)	618 (2.0)	274 (0.9)	126 (0.4)	30,773 (100.0)	13,372	44,145	103.75	32.16
女性 (%)	152 (0.9)	889 (5.3)	2,619 (15.7)	3,950 (23.6)	3,900 (23.3)	2,651 (15.9)	1,495 (8.9)	659 (3.9)	250 (1.5)	152 (0.9)	16,717 (100.0)	7,512	24,229	115.97	33.48
合計 (%)	820 (1.7)	4,165 (8.8)	9,717 (20.5)	11,727 (24.7)	9,813 (20.7)	6,045 (12.7)	3,124 (6.6)	1,277 (2.7)	524 (1.1)	278 (0.6)	47,490 (100.0)	20,884	68,374	108.05	33.15
記載なし (%)															
総計 (%)	820 (1.7)	4,165 (8.8)	9,717 (20.5)	11,727 (24.7)	9,813 (20.7)	6,045 (12.7)	3,124 (6.6)	1,277 (2.7)	524 (1.1)	278 (0.6)	47,490 (100.0)	20,884	68,374	108.05	33.15

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4630##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査