

表 1305 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別 (腹膜透析患者)

性別	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	18 (0.8)	103 (4.5)	309 (13.6)	516 (22.7)	509 (22.4)	380 (16.7)	237 (10.4)	126 (5.5)	36 (1.6)	38 (1.7)	2,272 (100.0)	3,330	5,602	120.26	36.61
女性 (%)	6 (0.5)	19 (1.6)	81 (6.7)	191 (15.7)	267 (22.0)	245 (20.2)	170 (14.0)	129 (10.6)	53 (4.4)	54 (4.4)	1,215 (100.0)	1,798	3,013	136.97	39.67
合計 (%)	24 (0.7)	122 (3.5)	390 (11.2)	707 (20.3)	776 (22.3)	625 (17.9)	407 (11.7)	255 (7.3)	89 (2.6)	92 (2.6)	3,487 (100.0)	5,128	8,615	126.08	38.53
記載なし (%)															
総計 (%)	24 (0.7)	122 (3.5)	390 (11.2)	707 (20.3)	776 (22.3)	625 (17.9)	407 (11.7)	255 (7.3)	89 (2.6)	92 (2.6)	3,487 (100.0)	5,128	8,615	126.08	38.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4640##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査