

表 1308 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 原疾患別(腹膜透析患者)

原疾患	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	8 (0.7)	28 (2.5)	105 (9.4)	226 (20.3)	243 (21.8)	223 (20.0)	137 (12.3)	85 (7.6)	26 (2.3)	32 (2.9)	1,113 (100.0)	1,553	2,666	128.39	37.32
慢性腎盂腎炎 (%)		4 (9.8)	4 (9.8)	2 (4.9)	8 (19.5)	9 (22.0)	9 (22.0)	3 (7.3)	2 (4.9)		41 (100.0)	56	97	129.78	36.90
急速進行性糸球体腎炎 (%)		1 (3.4)	1 (3.4)	6 (20.7)	10 (34.5)	4 (13.8)	2 (6.9)	2 (6.9)		3 (10.3)	29 (100.0)	32	61	137.34	56.14
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)				2 (18.2)	1 (9.1)	1 (9.1)	3 (27.3)	2 (18.2)	1 (9.1)	1 (9.1)	11 (100.0)	13	24	163.73	51.44
その他の分類不能の腎炎 (%)			4 (12.5)	6 (18.8)	8 (25.0)	5 (15.6)	7 (21.9)	2 (6.3)			32 (100.0)	43	75	126.88	29.24
多発性嚢胞腎 (%)		3 (2.8)	9 (8.5)	18 (17.0)	28 (26.4)	15 (14.2)	18 (17.0)	9 (8.5)	2 (1.9)	4 (3.8)	106 (100.0)	166	272	131.15	39.93
腎硬化症 (%)	3 (0.7)	9 (2.0)	50 (11.0)	89 (19.6)	111 (24.4)	78 (17.2)	52 (11.5)	41 (9.0)	10 (2.2)	11 (2.4)	454 (100.0)	652	1,106	127.80	38.00
悪性高血圧 (%)			8 (17.0)	9 (19.1)	12 (25.5)	7 (14.9)	3 (6.4)	3 (6.4)	3 (6.4)	2 (4.3)	47 (100.0)	59	106	127.19	39.07
糖尿病性腎症 (%)	8 (0.7)	65 (5.8)	159 (14.2)	249 (22.3)	234 (20.9)	180 (16.1)	106 (9.5)	70 (6.3)	27 (2.4)	21 (1.9)	1,119 (100.0)	1,627	2,746	119.99	38.29
SLE腎炎 (%)		1 (4.3)	3 (13.0)	4 (17.4)	4 (17.4)	4 (17.4)	3 (13.0)	1 (4.3)	2 (8.7)	1 (4.3)	23 (100.0)	32	55	130.70	42.91
アミロイド腎 (%)			1 (20.0)		2 (40.0)	1 (20.0)			1 (20.0)		5 (100.0)	11	16	132.40	45.52
痛風腎 (%)			2 (16.7)	3 (25.0)	4 (33.3)	1 (8.3)	1 (8.3)			1 (8.3)	12 (100.0)	11	23	119.83	37.74
先天性代謝異常による腎不全 (%)			1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)				6 (100.0)	11	17	121.17	28.17
腎・尿路結核 (%)												1	1		
腎・尿路結石 (%)			1 (12.5)		1 (12.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)		8 (100.0)	13	21	151.00	39.62
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)					4 (100.0)	8	12	117.00	15.98
閉塞性尿路障害 (%)			2 (22.2)	2 (22.2)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)			9 (100.0)	11	20	122.11	36.73
骨髄腫 (%)					1 (33.3)		1 (33.3)	1 (33.3)			3 (100.0)	4	7	157.33	27.93
腎形成不全 (%)	1 (7.1)		1 (7.1)	2 (14.3)	5 (35.7)	2 (14.3)	2 (14.3)		1 (7.1)		14 (100.0)	51	65	122.21	37.89
不明 (%)	4 (1.2)	8 (2.4)	30 (9.0)	60 (17.9)	73 (21.8)	64 (19.1)	43 (12.8)	27 (8.1)	12 (3.6)	14 (4.2)	335 (100.0)	554	889	131.36	40.79
再導入 (%)		2 (6.3)	1 (3.1)	9 (28.1)	5 (15.6)	9 (28.1)	5 (15.6)	1 (3.1)			32 (100.0)	33	65	121.41	28.60
その他 (%)		1 (1.2)	8 (9.5)	18 (21.4)	22 (26.2)	15 (17.9)	12 (14.3)	6 (7.1)		2 (2.4)	84 (100.0)	187	271	127.75	37.44
合計 (%)	24 (0.7)	122 (3.5)	390 (11.2)	707 (20.3)	776 (22.3)	625 (17.9)	407 (11.7)	255 (7.3)	89 (2.6)	92 (2.6)	3,487 (100.0)	5,128	8,615	126.08	38.53
記載なし (%)															
総計 (%)	24 (0.7)	122 (3.5)	390 (11.2)	707 (20.3)	776 (22.3)	625 (17.9)	407 (11.7)	255 (7.3)	89 (2.6)	92 (2.6)	3,487 (100.0)	5,128	8,615	126.08	38.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4643##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査