

表 1309 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	50未満	50~	70~	90~	110~	130~	150~	170~	190~	210~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
国公立大学	1 (%)	1 (0.7)	1 (0.7)	12 (7.9)	31 (20.4)	35 (23.0)	27 (17.8)	23 (15.1)	13 (8.6)	6 (3.9)	3 (2.0)	152 (100.0)	404	556	131.36	34.86
私立大学	2 (%)	15 (0.5)	37 (4.1)	66 (10.0)	84 (17.9)	63 (22.8)	58 (17.1)	26 (15.7)	11 (7.0)	7 (3.0)	7 (1.9)	369 (100.0)	780	1,149	127.46	36.50
国立病院機構等	1 (%)	5 (1.0)	11 (5.1)	23 (11.2)	18 (23.5)	15 (18.4)	12 (15.3)	6 (12.2)	3 (6.1)	4 (3.1)	4 (4.1)	98 (100.0)	129	227	124.85	39.44
県市町村立・国保	7 (%)	25 (1.0)	90 (3.7)	131 (13.3)	146 (19.3)	114 (21.5)	74 (16.8)	52 (10.9)	20 (7.7)	20 (2.9)	20 (2.9)	679 (100.0)	921	1,600	125.68	40.81
JCHO(旧社会保険)等	1 (%)	3 (1.0)	11 (3.0)	22 (10.9)	19 (21.8)	21 (18.8)	10 (20.8)	10 (9.9)	1 (9.9)	3 (1.0)	3 (3.0)	101 (100.0)	395	496	126.80	37.30
厚生連等	2 (%)	8 (0.7)	28 (2.9)	70 (10.2)	59 (25.5)	44 (21.5)	30 (16.0)	20 (10.9)	4 (7.3)	4 (1.5)	10 (3.6)	275 (100.0)	276	551	124.49	39.26
その他公的	3 (%)	22 (0.5)	70 (3.9)	101 (12.3)	139 (17.8)	96 (24.5)	61 (16.9)	43 (10.8)	15 (7.6)	17 (2.6)	17 (3.0)	567 (100.0)	760	1,327	126.13	40.84
私立総合	1 (%)	6 (0.5)	24 (3.2)	47 (13.0)	39 (25.4)	38 (21.1)	15 (20.5)	5 (8.1)	5 (2.7)	5 (2.7)	5 (2.7)	185 (100.0)	208	393	120.97	35.15
私立	5 (%)	26 (0.8)	67 (4.0)	133 (10.4)	134 (20.6)	133 (20.7)	63 (20.6)	54 (9.8)	14 (8.4)	17 (2.2)	17 (2.6)	646 (100.0)	980	1,626	126.46	39.45
私立診療所	1 (%)	11 (0.2)	40 (2.7)	83 (9.6)	103 (20.0)	74 (24.8)	61 (17.8)	26 (14.7)	10 (6.3)	6 (2.4)	6 (1.4)	415 (100.0)	275	690	126.37	33.84
総計	24 (%)	122 (0.7)	390 (3.5)	707 (11.2)	776 (20.3)	625 (22.3)	407 (17.9)	255 (11.7)	89 (7.3)	92 (2.6)	92 (2.6)	3,487 (100.0)	5,128	8,615	126.08	38.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4644##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査