

表 1310 透析前収縮期血圧(mmHg) 治療方法別 (透析患者全体)

治療方法	60未満	60~	80~	100~	120~	140~	160~	180~	200~	220~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析	32 (%)	317 (0.0)	2,857 (0.2)	15,163 (1.4)	45,329 (7.4)	68,505 (22.0)	49,199 (33.3)	18,696 (23.9)	4,574 (9.1)	926 (2.2)	205,598 (0.5)	28,106 (100.0)	233,704 (100.0)	151.05	24.17
血液透析濾過	10 (%)	167 (0.0)	1,086 (0.3)	5,132 (1.6)	14,451 (7.7)	21,730 (21.7)	15,812 (32.6)	6,296 (23.7)	1,598 (9.4)	363 (2.4)	66,645 (0.5)	8,154 (100.0)	74,799 (100.0)	151.16	24.91
血液濾過				3 (%)	3 (15.8)	5 (15.8)	2 (26.3)	5 (10.5)	1 (26.3)	19 (5.3)			19 (100.0)	153.37	31.39
血液吸着透析		8 (%)	43 (0.6)	164 (3.5)	308 (13.2)	425 (24.8)	208 (34.2)	67 (16.8)	15 (5.4)	3 (1.2)	1,241 (0.2)	114 (100.0)	1,355 (100.0)	142.63	25.10
在宅血液透析			19 (4.4)	69 (15.8)	149 (34.2)	118 (27.1)	61 (14.0)	18 (4.1)	2 (0.5)	436 (0.5)	181 (100.0)	617 (100.0)	617 (100.0)	138.24	23.31
腹膜透析	4 (%)	17 (0.1)	139 (0.3)	658 (2.6)	1,733 (12.2)	1,756 (32.2)	809 (32.6)	218 (15.0)	40 (4.0)	9 (0.7)	5,383 (0.2)	3,232 (100.0)	8,615 (100.0)	141.28	22.73
合計	46 (%)	509 (0.0)	4,144 (0.2)	21,189 (1.5)	61,973 (7.6)	92,539 (22.2)	66,091 (33.1)	25,300 (23.7)	6,230 (9.1)	1,301 (2.2)	279,322 (0.5)	39,787 (100.0)	319,109 (100.0)	150.83	24.37
記載なし															
総計	46 (%)	509 (0.0)	4,144 (0.2)	21,189 (1.5)	61,973 (7.6)	92,539 (22.2)	66,091 (33.1)	25,300 (23.7)	6,230 (9.1)	1,301 (2.2)	279,322 (0.5)	39,787 (100.0)	319,109 (100.0)	150.83	24.37

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4710##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査