

表 1312 透析前収縮期血圧(mmHg) 併用の状況別 (透析患者全体)

併用の状況	60未満	60~	80~	100~	120~	140~	160~	180~	200~	220~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
HD(F)単独	42 (%)	492 (0.0)	4,001 (0.2)	20,513 (1.5)	60,169 (7.5)	90,698 (22.0)	65,242 (33.1)	25,055 (23.8)	6,183 (9.2)	1,290 (2.3)	273,685 (0.5)	36,453 (100.0)	310,138 (100.0)	151.02	24.36	
PD単独	3 (%)	16 (0.1)	119 (0.4)	542 (2.9)	1,380 (13.4)	1,330 (34.1)	534 (32.8)	105 (13.2)	18 (2.6)	3 (0.4)	4,050 (0.1)	2,881 (100.0)	6,931 (100.0)	138.89	21.70	
HD(F)単独.PDカテあり			1 (0.6)	13 (8.4)	39 (25.3)	53 (34.4)	26 (16.9)	14 (9.1)	6 (3.9)	2 (1.3)	154 (100.0)	23 (100.0)	177 (100.0)	150.20	25.60	
PD.HD併用週1 HD(F)		1 (%)	17 (1.4)	104 (8.7)	308 (25.8)	388 (32.5)	246 (20.6)	103 (8.6)	21 (1.8)	6 (0.5)	1,194 (100.0)	302 (100.0)	1,496 (100.0)	148.93	24.16	
PD.HD併用週2 HD(F)	1 (%)		3 (2.1)	12 (8.6)	44 (31.4)	40 (28.6)	30 (21.4)	9 (6.4)	1 (0.7)		140 (100.0)	25 (100.0)	165 (100.0)	144.65	23.87	
PD.HD併用週3 HD(F)			1 (3.2)	2 (6.5)	8 (25.8)	12 (38.7)	2 (6.5)	6 (19.4)			31 (100.0)	6 (100.0)	37 (100.0)	148.81	25.57	
PD.HD併用週4 HD(F)					1 (100.0)						1 (100.0)		1 (100.0)	133.00		
PD.HD併用その他				1 (2.0)	17 (34.0)	15 (30.0)	10 (20.0)	6 (12.0)	1 (2.0)		50 (100.0)	13 (100.0)	63 (100.0)	152.96	22.60	
合計	46 (%)	509 (0.0)	4,142 (0.2)	21,187 (1.5)	61,966 (7.6)	92,536 (22.2)	66,090 (33.1)	25,298 (23.7)	6,230 (9.1)	1,301 (2.2)	279,305 (0.5)	39,703 (100.0)	319,008 (100.0)	150.83	24.37	
不明				2 (11.8)	2 (11.8)	7 (41.2)	3 (17.6)	1 (5.9)	2 (11.8)			17 (100.0)	5 (100.0)	22 (100.0)	138.00	28.57
記載なし												79 (100.0)	79 (100.0)			
総計	46 (%)	509 (0.0)	4,144 (0.2)	21,189 (1.5)	61,973 (7.6)	92,539 (22.2)	66,091 (33.1)	25,300 (23.7)	6,230 (9.1)	1,301 (2.2)	279,322 (0.5)	39,787 (100.0)	319,109 (100.0)	150.83	24.37	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4712##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査