

表 1313 透析前収縮期血圧(mmHg) 性別 (透析患者全体)

性別	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	19 (0.0)	238 (0.1)	2,264 (1.3)	12,722 (7.1)	39,161 (21.7)	60,767 (33.7)	43,650 (24.2)	16,585 (9.2)	3,979 (2.2)	828 (0.5)	180,213 (100.0)	25,710 (100.0)	205,923 (100.0)	151.43 (100.0)	23.93 (100.0)
女性 (%)	27 (0.0)	271 (0.3)	1,880 (1.9)	8,467 (8.5)	22,811 (23.0)	31,772 (32.1)	22,441 (22.6)	8,715 (8.8)	2,251 (2.3)	473 (0.5)	99,108 (100.0)	14,077 (100.0)	113,185 (100.0)	149.73 (100.0)	25.12 (100.0)
合計 (%)	46 (0.0)	509 (0.2)	4,144 (1.5)	21,189 (7.6)	61,972 (22.2)	92,539 (33.1)	66,091 (23.7)	25,300 (9.1)	6,230 (2.2)	1,301 (0.5)	279,321 (100.0)	39,787 (100.0)	319,108 (100.0)	150.83 (100.0)	24.37 (100.0)
記載なし (%)					1 (100.0)					1 (100.0)			1 (100.0)	128.00 (100.0)	
総計 (%)	46 (0.0)	509 (0.2)	4,144 (1.5)	21,189 (7.6)	61,973 (22.2)	92,539 (33.1)	66,091 (23.7)	25,300 (9.1)	6,230 (2.2)	1,301 (0.5)	279,322 (100.0)	39,787 (100.0)	319,109 (100.0)	150.83 (100.0)	24.37 (100.0)

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4713##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査