

表 1317 透析前収縮期血圧(mmHg) 医療機関別 (透析患者全体)

医療機関	60未満	60~	80~	100~	120~	140~	160~	180~	200~	220~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)		1 (0.1)	32 (4.0)	109 (13.6)	257 (32.0)	253 (31.5)	113 (14.1)	27 (3.4)	7 (0.9)	3 (0.4)	802 (100.0)	322	1,124	140.01	23.32
私立大学 (%)		6 (0.2)	50 (2.0)	227 (9.2)	625 (25.4)	823 (33.4)	492 (20.0)	196 (8.0)	34 (1.4)	8 (0.3)	2,461 (100.0)	1,225	3,686	147.37	24.40
国立病院機構等 (%)		1 (0.2)	26 (3.9)	78 (11.7)	157 (23.6)	214 (32.2)	121 (18.2)	46 (6.9)	18 (2.7)	3 (0.5)	664 (100.0)	247	911	145.88	26.29
県市町村立・国保 (%)	3 (0.0)	33 (0.2)	277 (1.7)	1,367 (8.4)	3,667 (22.6)	5,456 (33.6)	3,635 (22.4)	1,363 (8.4)	370 (2.3)	53 (0.3)	16,224 (100.0)	3,524	19,748	149.73	24.48
JCHO(旧社会保険)等 (%)	1 (0.0)	6 (0.2)	51 (1.6)	251 (7.7)	688 (21.2)	1,142 (35.1)	749 (23.1)	288 (8.9)	63 (1.9)	10 (0.3)	3,249 (100.0)	516	3,765	150.55	23.94
厚生連等 (%)		14 (0.2)	117 (1.4)	677 (8.2)	1,863 (22.6)	2,672 (32.3)	1,895 (22.9)	793 (9.6)	183 (2.2)	46 (0.6)	8,260 (100.0)	1,125	9,385	150.77	24.80
その他公的 (%)	2 (0.0)	23 (0.3)	172 (2.0)	756 (8.9)	2,058 (24.2)	2,714 (31.9)	1,913 (22.5)	690 (8.1)	159 (1.9)	30 (0.4)	8,517 (100.0)	2,341	10,858	148.64	24.68
私立総合 (%)	1 (0.0)	17 (0.3)	79 (1.2)	553 (8.3)	1,511 (22.6)	2,144 (32.1)	1,638 (24.5)	587 (8.8)	124 (1.9)	28 (0.4)	6,682 (100.0)	1,131	7,813	150.55	24.14
私立 (%)	17 (0.0)	177 (0.2)	1,407 (1.7)	6,853 (8.5)	18,409 (22.8)	26,235 (32.5)	18,408 (22.8)	7,048 (8.7)	1,735 (2.2)	343 (0.4)	80,632 (100.0)	10,957	91,589	149.81	24.73
私立診療所 (%)	22 (0.0)	231 (0.2)	1,933 (1.3)	10,318 (6.8)	32,738 (21.6)	50,886 (33.5)	37,127 (24.5)	14,262 (9.4)	3,537 (2.3)	777 (0.5)	151,831 (100.0)	18,399	170,230	151.76	24.09
総計 (%)	46 (0.0)	509 (0.2)	4,144 (1.5)	21,189 (7.6)	61,973 (22.2)	92,539 (33.1)	66,091 (23.7)	25,300 (9.1)	6,230 (2.2)	1,301 (0.5)	279,322 (100.0)	39,787	319,109	150.83	24.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4717##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査