

表 1318 透析前収縮期血圧(mmHg) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	14 (0.0)	151 (0.1)	1,492 (1.2)	8,690 (6.8)	27,506 (21.6)	43,155 (33.9)	31,260 (24.5)	11,770 (9.2)	2,804 (2.2)	571 (0.4)	127,413 (100.0)	8,037 (100.0)	135,450 (100.0)	151.65 (100.0)	23.74 (100.0)
女性 (%)	17 (0.0)	151 (0.2)	1,199 (1.7)	5,708 (8.2)	15,838 (22.7)	22,653 (32.4)	16,142 (23.1)	6,238 (8.9)	1,599 (2.3)	332 (0.5)	69,877 (100.0)	4,208 (100.0)	74,085 (100.0)	150.25 (100.0)	24.82 (100.0)
合計 (%)	31 (0.0)	302 (0.2)	2,691 (1.4)	14,398 (7.3)	43,344 (22.0)	65,808 (33.4)	47,402 (24.0)	18,008 (9.1)	4,403 (2.2)	903 (0.5)	197,290 (100.0)	12,245 (100.0)	209,535 (100.0)	151.15 (100.0)	24.14 (100.0)
記載なし (%)					1 (100.0)					1 (100.0)		1 (100.0)	128.00 (100.0)		
総計 (%)	31 (0.0)	302 (0.2)	2,691 (1.4)	14,398 (7.3)	43,345 (22.0)	65,808 (33.4)	47,402 (24.0)	18,008 (9.1)	4,403 (2.2)	903 (0.5)	197,291 (100.0)	12,245 (100.0)	209,536 (100.0)	151.15 (100.0)	24.14 (100.0)

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4720##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査