

表 1321 透析前収縮期血圧(mmHg) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	12 (0.0)	108 (0.2)	874 (1.6)	4,495 (8.3)	13,282 (24.6)	18,854 (35.0)	11,830 (21.9)	3,591 (6.7)	728 (1.4)	129 (0.2)	53,903 (100.0)	3,269	57,172	147.85	23.02
慢性腎盂腎炎 (%)		8 (0.5)	44 (2.5)	185 (10.4)	418 (23.6)	576 (32.5)	383 (21.6)	133 (7.5)	23 (1.3)	4 (0.2)	1,774 (100.0)	94	1,868	146.57	24.46
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	26 (1.6)	151 (9.4)	403 (25.2)	553 (34.6)	339 (21.2)	101 (6.3)	19 (1.2)	4 (0.3)	1,598 (100.0)	89	1,687	147.01	23.09
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		2 (0.2)	15 (1.9)	76 (9.5)	215 (26.7)	262 (32.6)	168 (20.9)	60 (7.5)	5 (0.6)	1 (0.1)	804 (100.0)	45	849	146.64	23.12
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	15 (1.8)	89 (10.5)	196 (23.2)	285 (33.8)	186 (22.0)	57 (6.8)	11 (1.3)	2 (0.2)	844 (100.0)	58	902	146.89	23.68
多発性嚢胞腎 (%)		15 (0.2)	111 (1.6)	652 (9.2)	1,976 (27.8)	2,600 (36.6)	1,348 (19.0)	349 (4.9)	57 (0.8)	5 (0.1)	7,113 (100.0)	435	7,548	145.27	21.70
腎硬化症 (%)	3 (0.0)	32 (0.2)	304 (1.5)	1,758 (8.6)	5,040 (24.8)	7,043 (34.6)	4,333 (21.3)	1,495 (7.3)	293 (1.4)	47 (0.2)	20,348 (100.0)	1,170	21,518	148.09	23.27
悪性高血圧 (%)		1 (0.1)	14 (0.8)	98 (5.9)	365 (22.1)	556 (33.6)	418 (25.3)	159 (9.6)	35 (2.1)	7 (0.4)	1,653 (100.0)	124	1,777	152.31	23.42
糖尿病性腎症 (%)	6 (0.0)	64 (0.1)	651 (0.8)	4,063 (5.1)	14,026 (17.6)	25,290 (31.8)	22,005 (27.7)	9,969 (12.5)	2,803 (3.5)	625 (0.8)	79,502 (100.0)	4,966	84,468	156.43	24.40
SLE腎炎 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	30 (2.3)	111 (8.6)	362 (28.0)	430 (33.3)	251 (19.4)	88 (6.8)	13 (1.0)	4 (0.3)	1,292 (100.0)	78	1,370	146.18	23.73
アミロイド腎 (%)		2 (0.7)	5 (1.9)	34 (12.7)	75 (28.1)	81 (30.3)	56 (21.0)	12 (4.5)	2 (0.7)		267 (100.0)	13	280	143.20	23.64
痛風腎 (%)		3 (0.5)	16 (2.4)	71 (10.8)	156 (23.7)	216 (32.9)	133 (20.2)	53 (8.1)	5 (0.8)	4 (0.6)	657 (100.0)	43	700	146.90	25.10
先天性代謝異常による腎不全 (%)		2 (1.3)	5 (3.1)	26 (16.3)	48 (30.0)	43 (26.9)	33 (20.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	160 (100.0)	9	169	139.28	25.13
腎・尿路結核 (%)		1 (1.0)	2 (2.0)	13 (13.1)	24 (24.2)	27 (27.3)	24 (24.2)	5 (5.1)	2 (2.0)	1 (1.0)	99 (100.0)	7	106	146.30	26.39
腎・尿路結石 (%)		2 (0.5)	7 (1.9)	39 (10.7)	93 (25.4)	125 (34.2)	70 (19.1)	19 (5.2)	11 (3.0)		366 (100.0)	18	384	146.53	24.64
腎・尿路腫瘍 (%)			9 (1.5)	50 (8.1)	157 (25.3)	210 (33.9)	141 (22.7)	39 (6.3)	14 (2.3)		620 (100.0)	24	644	148.65	22.76
閉塞性尿路障害 (%)		2 (0.5)	6 (1.4)	50 (11.3)	106 (23.9)	141 (31.8)	104 (23.5)	24 (5.4)	8 (1.8)	2 (0.5)	443 (100.0)	22	465	147.02	24.19
骨髄腫 (%)			6 (3.0)	35 (17.5)	59 (29.5)	60 (30.0)	32 (16.0)	7 (3.5)	1 (0.5)		200 (100.0)	13	213	139.46	22.24
腎形成不全 (%)			7 (2.0)	42 (12.0)	108 (30.9)	111 (31.8)	60 (17.2)	13 (3.7)	7 (2.0)	1 (0.3)	349 (100.0)	19	368	143.21	23.53
不明 (%)	3 (0.0)	38 (0.2)	380 (2.0)	1,720 (9.0)	4,676 (24.5)	6,331 (33.2)	4,241 (22.2)	1,381 (7.2)	277 (1.5)	51 (0.3)	19,098 (100.0)	1,380	20,478	147.81	23.82
再導入 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	28 (2.5)	109 (9.8)	286 (25.8)	366 (33.0)	227 (20.5)	65 (5.9)	20 (1.8)	4 (0.4)	1,108 (100.0)	56	1,164	146.40	24.62
その他 (%)	3 (0.1)	15 (0.3)	136 (2.7)	531 (10.4)	1,274 (25.0)	1,648 (32.4)	1,020 (20.0)	387 (7.6)	68 (1.3)	11 (0.2)	5,093 (100.0)	313	5,406	146.30	24.62
合計 (%)	31 (0.0)	302 (0.2)	2,691 (1.4)	14,398 (7.3)	43,345 (22.0)	65,808 (33.4)	47,402 (24.0)	18,008 (9.1)	4,403 (2.2)	903 (0.5)	197,291 (100.0)	12,245	209,536	151.15	24.14
記載なし (%)															
総計 (%)	31 (0.0)	302 (0.2)	2,691 (1.4)	14,398 (7.3)	43,345 (22.0)	65,808 (33.4)	47,402 (24.0)	18,008 (9.1)	4,403 (2.2)	903 (0.5)	197,291 (100.0)	12,245	209,536	151.15	24.14

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4723##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査