

表 1323 透析前収縮期血圧(mmHg) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	4 (0.0)	70 (0.2)	571 (1.4)	2,988 (7.1)	8,789 (20.9)	13,945 (33.2)	10,322 (24.6)	4,065 (9.7)	1,002 (2.4)	229 (0.5)	41,985 (100.0)	2,160	44,145	152.02	24.40
女性 (%)	6 (0.0)	94 (0.4)	472 (2.1)	2,004 (8.7)	5,252 (22.9)	7,257 (31.6)	5,107 (22.2)	2,094 (9.1)	560 (2.4)	126 (0.5)	22,972 (100.0)	1,257	24,229	149.75	25.73
合計 (%)	10 (0.0)	164 (0.3)	1,043 (1.6)	4,992 (7.7)	14,041 (21.6)	21,202 (32.6)	15,429 (23.8)	6,159 (9.5)	1,562 (2.4)	355 (0.5)	64,957 (100.0)	3,417	68,374	151.22	24.90
記載なし (%)															
総計 (%)	10 (0.0)	164 (0.3)	1,043 (1.6)	4,992 (7.7)	14,041 (21.6)	21,202 (32.6)	15,429 (23.8)	6,159 (9.5)	1,562 (2.4)	355 (0.5)	64,957 (100.0)	3,417	68,374	151.22	24.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4730##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査