

表 1324 透析前収縮期血圧(mmHg) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)															
15歳～ (%)			4 (1.8)	21 (9.4)	68 (30.5)	81 (36.3)	33 (14.8)	14 (6.3)	1 (0.4)	1 (0.4)	223 (100.0)	11	234	144.74	22.74
30歳～ (%)	1 (0.0)	4 (0.1)	43 (1.2)	242 (7.0)	716 (20.6)	1,111 (32.0)	845 (24.4)	373 (10.8)	103 (3.0)	31 (0.9)	3,469 (100.0)	220	3,689	153.25	25.24
45歳～ (%)	1 (0.0)	36 (0.3)	174 (1.2)	965 (6.7)	2,848 (19.9)	4,609 (32.2)	3,599 (25.2)	1,516 (10.6)	438 (3.1)	112 (0.8)	14,298 (100.0)	736	15,034	153.37	25.28
60歳～ (%)	3 (0.0)	67 (0.2)	481 (1.6)	2,112 (7.1)	6,364 (21.4)	9,854 (33.1)	7,203 (24.2)	2,863 (9.6)	672 (2.3)	152 (0.5)	29,771 (100.0)	1,558	31,329	151.55	24.52
75歳～ (%)	5 (0.0)	52 (0.3)	304 (1.9)	1,540 (9.4)	3,853 (23.5)	5,294 (32.3)	3,599 (22.0)	1,340 (8.2)	331 (2.0)	57 (0.3)	16,375 (100.0)	854	17,229	148.76	24.85
90歳～ (%)		5 (0.6)	37 (4.5)	112 (13.6)	192 (23.4)	253 (30.8)	150 (18.3)	53 (6.5)	17 (2.1)	2 (0.2)	821 (100.0)	38	859	143.47	26.32
合計 (%)	10 (0.0)	164 (0.3)	1,043 (1.6)	4,992 (7.7)	14,041 (21.6)	21,202 (32.6)	15,429 (23.8)	6,159 (9.5)	1,562 (2.4)	355 (0.5)	64,957 (100.0)	3,417	68,374	151.22	24.90
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	10 (0.0)	164 (0.3)	1,043 (1.6)	4,992 (7.7)	14,041 (21.6)	21,202 (32.6)	15,429 (23.8)	6,159 (9.5)	1,562 (2.4)	355 (0.5)	64,957 (100.0)	3,417	68,374	151.22	24.90
平均	69.80	68.31	68.63	67.73	66.78	66.05	65.52	64.95	64.15	62.39	66.09	65.68	66.07		
標準偏差	15.01	12.67	12.53	12.82	12.56	12.39	12.27	12.32	12.37	12.67	12.46	12.69	12.47		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4731##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査