

表 1327 透析前収縮期血圧(mmHg) 医療機関別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

医療機関	60未満	60~	80~	100~	120~	140~	160~	180~	200~	220~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)			1 (1.9)	11 (20.8)	12 (22.6)	18 (34.0)	9 (17.0)	2 (3.8)			53 (100.0)	1 (100.0)	54	140.04	23.42
私立大学 (%)		1 (0.4)	5 (2.1)	28 (12.0)	47 (20.1)	79 (33.8)	50 (21.4)	16 (6.8)	5 (2.1)	3 (1.3)	234 (100.0)	3 (100.0)	237	148.41	26.72
国立病院機構等 (%)			1 (1.8)	4 (7.3)	16 (29.1)	11 (20.0)	19 (34.5)	4 (7.3)			55 (100.0)		55	150.45	22.10
県市町村立・国保 (%)	7 (0.3)	44 (1.8)	204 (8.4)	505 (20.9)	783 (32.4)	562 (23.3)	229 (9.5)	74 (3.1)	9 (0.4)	2,417 (100.0)	141 (100.0)	2,558	151.21	25.61	
JCHO(旧社会保険)等 (%)	2 (0.4)	16 (3.1)	45 (8.7)	105 (20.3)	155 (30.0)	115 (22.2)	65 (12.6)	13 (2.5)	1 (0.2)	517 (100.0)	9 (100.0)	526	150.40	26.50	
厚生連等 (%)	6 (0.4)	33 (2.3)	124 (8.7)	321 (22.4)	456 (31.8)	317 (22.1)	139 (9.7)	24 (1.7)	13 (0.9)	1,433 (100.0)	38 (100.0)	1,471	149.94	26.17	
その他公的 (%)	7 (0.7)	19 (1.9)	96 (9.4)	232 (22.8)	301 (29.6)	250 (24.6)	90 (8.8)	20 (2.0)	3 (0.3)	1,018 (100.0)	64 (100.0)	1,082	148.95	25.47	
私立総合 (%)	7 (0.5)	17 (1.2)	124 (8.9)	273 (19.6)	453 (32.5)	367 (26.3)	122 (8.8)	27 (1.9)	4 (0.3)	1,394 (100.0)	71 (100.0)	1,465	151.13	24.67	
私立 (%)	5 (0.0)	51 (0.3)	330 (1.9)	1,447 (8.4)	3,908 (22.7)	5,556 (32.2)	3,880 (22.5)	1,570 (9.1)	391 (2.3)	93 (0.5)	17,231 (100.0)	774 (100.0)	18,005	150.11	25.25
私立診療所 (%)	5 (0.0)	83 (0.2)	577 (1.4)	2,909 (7.2)	8,622 (21.2)	13,390 (33.0)	9,860 (24.3)	3,922 (9.7)	1,008 (2.5)	229 (0.6)	40,605 (100.0)	2,316 (100.0)	42,921	151.83	24.61
総計 (%)	10 (0.0)	164 (0.3)	1,043 (1.6)	4,992 (7.7)	14,041 (21.6)	21,202 (32.6)	15,429 (23.8)	6,159 (9.5)	1,562 (2.4)	355 (0.5)	64,957 (100.0)	3,417 (100.0)	68,374	151.22	24.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4734##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査