

表 1328 収縮期血圧(mmHg) 性別 (腹膜透析患者)

| 性別          | 60未満       | 60～         | 80～          | 100～          | 120～            | 140～            | 160～          | 180～         | 200～        | 220～       | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均     | 標準偏差  |
|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------|-------|--------|-------|
| 男性<br>(%)   | 1<br>(0.0) | 7<br>(0.2)  | 75<br>(2.1)  | 371<br>(10.5) | 1,116<br>(31.7) | 1,221<br>(34.6) | 546<br>(15.5) | 150<br>(4.3) | 31<br>(0.9) | 6<br>(0.2) | 3,524<br>(100.0) | 2,078 | 5,602 | 142.71 | 22.08 |
| 女性<br>(%)   | 3<br>(0.2) | 10<br>(0.5) | 64<br>(3.4)  | 287<br>(15.4) | 617<br>(33.2)   | 535<br>(28.8)   | 263<br>(14.1) | 68<br>(3.7)  | 9<br>(0.5)  | 3<br>(0.2) | 1,859<br>(100.0) | 1,154 | 3,013 | 138.58 | 23.68 |
| 合計<br>(%)   | 4<br>(0.1) | 17<br>(0.3) | 139<br>(2.6) | 658<br>(12.2) | 1,733<br>(32.2) | 1,756<br>(32.6) | 809<br>(15.0) | 218<br>(4.0) | 40<br>(0.7) | 9<br>(0.2) | 5,383<br>(100.0) | 3,232 | 8,615 | 141.28 | 22.73 |
| 記載なし<br>(%) |            |             |              |               |                 |                 |               |              |             |            |                  |       |       |        |       |
| 総計<br>(%)   | 4<br>(0.1) | 17<br>(0.3) | 139<br>(2.6) | 658<br>(12.2) | 1,733<br>(32.2) | 1,756<br>(32.6) | 809<br>(15.0) | 218<br>(4.0) | 40<br>(0.7) | 9<br>(0.2) | 5,383<br>(100.0) | 3,232 | 8,615 | 141.28 | 22.73 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4740##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査