

表 1332 収縮期血圧(mmHg) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	60未満	60~	80~	100~	120~	140~	160~	180~	200~	220~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
国公立大学 (%)			11 (3.6)	45 (14.6)	124 (40.3)	93 (30.2)	30 (9.7)	4 (1.3)		1 (0.3)	308 (100.0)	248	556	135.94	19.79	
私立大学 (%)			11 (1.6)	74 (10.6)	231 (33.2)	246 (35.4)	99 (14.2)	27 (3.9)	6 (0.9)	1 (0.1)	695 (100.0)	454	1,149	142.04	21.39	
国立病院機構等 (%)			10 (5.7)	25 (14.2)	49 (27.8)	67 (38.1)	20 (11.4)	4 (2.3)	1 (0.6)		176 (100.0)	51	227	139.06	23.01	
県市町村立・国保 (%)	1 (0.1)	5 (0.5)	33 (3.0)	156 (14.4)	366 (33.8)	322 (29.8)	154 (14.2)	37 (3.4)	6 (0.6)	2 (0.2)	1,082 (100.0)	518	1,600	139.06	22.80	
JCHO(旧社会保険)等 (%)			1 (0.7)	1 (0.7)	15 (9.9)	50 (32.9)	56 (36.8)	23 (15.1)	4 (2.6)	2 (1.3)		152 (100.0)	344	496	143.11	21.48
厚生連等 (%)			1 (0.3)	6 (1.7)	46 (13.3)	109 (31.4)	105 (30.3)	61 (17.6)	17 (4.9)	1 (0.3)	347 (100.0)	204	551	142.26	23.18	
その他公的 (%)	2 (0.2)	4 (0.4)	33 (3.7)	101 (11.3)	284 (31.9)	292 (32.8)	119 (13.4)	49 (5.5)	5 (0.6)	1 (0.1)	890 (100.0)	437	1,327	141.21	23.81	
私立総合 (%)			1 (0.3)	4 (1.3)	29 (9.4)	108 (35.2)	100 (32.6)	51 (16.6)	11 (3.6)	2 (0.7)	307 (100.0)	86	393	142.99	21.54	
私立 (%)	1 (0.1)	3 (0.3)	24 (2.6)	115 (12.7)	271 (29.8)	292 (32.1)	156 (17.2)	35 (3.9)	11 (1.2)	1 (0.1)	909 (100.0)	717	1,626	141.89	23.32	
私立診療所 (%)			2 (0.4)	6 (1.2)	52 (10.1)	141 (27.3)	183 (35.4)	96 (18.6)	30 (5.8)	6 (1.2)	1 (0.2)	517 (100.0)	173	690	145.70	22.66
総計 (%)	4 (0.1)	17 (0.3)	139 (2.6)	658 (12.2)	1,733 (32.2)	1,756 (32.6)	809 (15.0)	218 (4.0)	40 (0.7)	9 (0.2)	5,383 (100.0)	3,232	8,615	141.28	22.73	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4744##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査