

表 1333 透析前拡張期血圧(mmHg) 治療方法別 (透析患者全体)

治療方法	20未満	20~	40~	60~	80~	90~	100~	120~	140~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	67 (0.0)	718 (0.3)	18,450 (9.0)	97,111 (47.3)	49,292 (24.0)	26,221 (12.8)	12,559 (6.1)	857 (0.4)	56 (0.0)	205,331 (100.0)	28,373	233,704	77.31	14.40
血液透析濾過 (%)	26 (0.0)	259 (0.4)	5,120 (7.7)	29,095 (43.7)	16,957 (25.5)	9,765 (14.7)	4,996 (7.5)	345 (0.5)	31 (0.0)	66,594 (100.0)	8,205	74,799	78.99	14.73
血液濾過 (%)			2 (10.5)	7 (36.8)	6 (31.6)	3 (15.8)		1 (5.3)		19 (100.0)		19	78.63	15.20
血液吸着透析 (%)		6 (0.5)	155 (12.6)	644 (52.3)	260 (21.1)	115 (9.3)	51 (4.1)	1 (0.1)		1,232 (100.0)	123	1,355	74.18	13.99
在宅血液透析 (%)		1 (0.2)	40 (9.2)	178 (40.7)	118 (27.0)	58 (13.3)	38 (8.7)	4 (0.9)		437 (100.0)	180	617	79.23	15.08
腹膜透析 (%)		14 (0.3)	410 (7.7)	2,254 (42.2)	1,412 (26.5)	782 (14.6)	437 (8.2)	29 (0.5)		5,338 (100.0)	3,277	8,615	79.32	14.45
合計 (%)	93 (0.0)	998 (0.4)	24,177 (8.7)	129,289 (46.3)	68,045 (24.4)	36,944 (13.2)	18,081 (6.5)	1,237 (0.4)	87 (0.0)	278,951 (100.0)	40,158	319,109	77.73	14.50
記載なし (%)														
総計 (%)	93 (0.0)	998 (0.4)	24,177 (8.7)	129,289 (46.3)	68,045 (24.4)	36,944 (13.2)	18,081 (6.5)	1,237 (0.4)	87 (0.0)	278,951 (100.0)	40,158	319,109	77.73	14.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4810##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査