

表 1335 透析前拡張期血圧(mmHg) 併用の状況別 (透析患者全体)

併用の状況	20未満	20~	40~	60~	80~	90~	100~	120~	140~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)	93 (0.0)	984 (0.4)	23,747 (8.7)	126,927 (46.4)	66,579 (24.4)	36,120 (13.2)	17,619 (6.4)	1,204 (0.4)	86 (0.0)	273,359 (100.0)	36,779 (100.0)	310,138 (100.0)	77.70 (100.0)	14.49 (100.0)
PD単独 (%)		11 (0.3)	336 (8.4)	1,754 (43.7)	1,058 (26.3)	564 (14.0)	277 (6.9)	17 (0.4)		4,017 (100.0)	2,914 (100.0)	6,931 (100.0)	78.40 (100.0)	14.28 (100.0)
HD(F)単独.PDカテあり (%)		10 (6.5)	75 (48.7)	26 (16.9)	25 (16.2)	15 (9.7)	2 (1.3)	1 (0.6)	154 (100.0)		23 (100.0)	177 (100.0)	80.64 (100.0)	16.59 (100.0)
PD.HD併用週1HD(F) (%)		2 (0.2)	62 (5.2)	457 (38.5)	315 (26.5)	195 (16.4)	147 (12.4)	9 (0.8)		1,187 (100.0)	309 (100.0)	1,496 (100.0)	82.13 (100.0)	14.43 (100.0)
PD.HD併用週2HD(F) (%)		1 (0.7)	13 (9.6)	43 (31.9)	42 (31.1)	21 (15.6)	13 (9.6)	2 (1.5)		135 (100.0)	30 (100.0)	165 (100.0)	80.87 (100.0)	15.84 (100.0)
PD.HD併用週3HD(F) (%)		4 (12.9)	8 (25.8)	8 (25.8)	5 (16.1)	4 (12.9)	2 (6.5)		31 (100.0)		6 (100.0)	37 (100.0)	84.03 (100.0)	17.64 (100.0)
PD.HD併用週4HD(F) (%)			1 (100.0)						1 (100.0)			1 (100.0)	87.00 (100.0)	
PD.HD併用その他 (%)		1 (2.0)	16 (32.0)	16 (32.0)	12 (24.0)	4 (8.0)	1 (2.0)		50 (100.0)		13 (100.0)	63 (100.0)	84.50 (100.0)	13.37 (100.0)
合計 (%)	93 (0.0)	998 (0.4)	24,173 (8.7)	129,280 (46.3)	68,045 (24.4)	36,942 (13.2)	18,079 (6.5)	1,237 (0.4)	87 (0.0)	278,934 (100.0)	40,074 (100.0)	319,008 (100.0)	77.74 (100.0)	14.50 (100.0)
不明 (%)			4 (23.5)	9 (52.9)		2 (11.8)	2 (11.8)			17 (100.0)	5 (100.0)	22 (100.0)	72.71 (100.0)	17.75 (100.0)
記載なし (%)											79 (100.0)	79 (100.0)		
総計 (%)	93 (0.0)	998 (0.4)	24,177 (8.7)	129,289 (46.3)	68,045 (24.4)	36,944 (13.2)	18,081 (6.5)	1,237 (0.4)	87 (0.0)	278,951 (100.0)	40,158 (100.0)	319,109 (100.0)	77.73 (100.0)	14.50 (100.0)

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D4812#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査