

表 1336 透析前拡張期血圧(mmHg) 性別 (透析患者全体)

性別	20未満	20 ~	40 ~	60 ~	80 ~	90 ~	100 ~	120 ~	140 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	58 (0.0)	503 (0.3)	13,680 (7.6)	81,067 (45.0)	44,983 (25.0)	25,678 (14.3)	13,057 (7.3)	918 (0.5)	49 (0.0)	179,993 (100.0)	25,930 (100.0)	205,923 (100.0)	78.66 (100.0)	14.47 (100.0)
女性 (%)	35 (0.0)	495 (0.5)	10,496 (10.6)	48,222 (48.7)	23,062 (23.3)	11,266 (11.4)	5,024 (5.1)	319 (0.3)	38 (0.0)	98,957 (100.0)	14,228 (100.0)	113,185 (100.0)	76.06 (100.0)	14.40 (100.0)
合計 (%)	93 (0.0)	998 (0.4)	24,176 (8.7)	129,289 (46.3)	68,045 (24.4)	36,944 (13.2)	18,081 (6.5)	1,237 (0.4)	87 (0.0)	278,950 (100.0)	40,158 (100.0)	319,108 (100.0)	77.74 (100.0)	14.50 (100.0)
記載なし (%)			1 (100.0)							1 (100.0)		1 (100.0)	56.00 (100.0)	
総計 (%)	93 (0.0)	998 (0.4)	24,177 (8.7)	129,289 (46.3)	68,045 (24.4)	36,944 (13.2)	18,081 (6.5)	1,237 (0.4)	87 (0.0)	278,951 (100.0)	40,158 (100.0)	319,109 (100.0)	77.73 (100.0)	14.50 (100.0)

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4813##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査