

表 1344 透析前拡張期血圧(mmHg) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	12 (0.0)	196 (0.4)	4,220 (7.8)	24,822 (46.1)	13,668 (25.4)	7,362 (13.7)	3,294 (6.1)	215 (0.4)	14 (0.0)	53,803 (100.0)	3,369	57,172	77.95	14.19
慢性腎盂腎炎 (%)		10 (0.6)	162 (9.1)	815 (46.0)	423 (23.9)	237 (13.4)	117 (6.6)	7 (0.4)		1,771 (100.0)	97	1,868	77.59	14.68
急速進行性糸球体腎炎 (%)		4 (0.3)	139 (8.7)	777 (48.6)	369 (23.1)	192 (12.0)	111 (6.9)	6 (0.4)		1,598 (100.0)	89	1,687	77.19	14.30
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	66 (8.2)	363 (45.2)	214 (26.7)	98 (12.2)	57 (7.1)	2 (0.2)		803 (100.0)	46	849	77.71	14.55
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	68 (8.1)	368 (43.7)	211 (25.0)	116 (13.8)	72 (8.5)	6 (0.7)		843 (100.0)	59	902	78.94	14.95
多発性嚢胞腎 (%)	1 (0.0)	15 (0.2)	427 (6.0)	3,102 (43.7)	1,986 (28.0)	1,056 (14.9)	489 (6.9)	23 (0.3)	1 (0.0)	7,100 (100.0)	448	7,548	79.35	13.57
腎硬化症 (%)	2 (0.0)	74 (0.4)	2,244 (11.0)	10,241 (50.4)	4,495 (22.1)	2,176 (10.7)	1,025 (5.0)	63 (0.3)	6 (0.0)	20,326 (100.0)	1,192	21,518	75.57	14.17
悪性高血圧 (%)		5 (0.3)	110 (6.7)	640 (38.8)	399 (24.2)	286 (17.3)	182 (11.0)	28 (1.7)	1 (0.1)	1,651 (100.0)	126	1,777	81.70	16.10
糖尿病性腎症 (%)	34 (0.0)	236 (0.3)	7,238 (9.1)	37,842 (47.6)	18,717 (23.6)	9,995 (12.6)	4,970 (6.3)	370 (0.5)	20 (0.0)	79,422 (100.0)	5,046	84,468	77.28	14.46
SLE腎炎 (%)	1 (0.1)	5 (0.4)	97 (7.5)	554 (43.0)	340 (26.4)	196 (15.2)	92 (7.1)	4 (0.3)		1,289 (100.0)	81	1,370	78.68	14.53
アミロイド腎 (%)			32 (12.0)	115 (43.1)	64 (24.0)	38 (14.2)	18 (6.7)			267 (100.0)	13	280	76.99	14.55
痛風腎 (%)		2 (0.3)	51 (7.8)	320 (48.7)	160 (24.4)	75 (11.4)	47 (7.2)	2 (0.3)		657 (100.0)	43	700	77.84	14.07
先天性代謝異常による腎不全 (%)		3 (1.9)	18 (11.3)	64 (40.0)	41 (25.6)	21 (13.1)	10 (6.3)	2 (1.3)	1 (0.6)	160 (100.0)	9	169	77.78	17.84
腎・尿路結核 (%)			9 (9.1)	49 (49.5)	27 (27.3)	9 (9.1)	5 (5.1)			99 (100.0)	7	106	75.67	13.88
腎・尿路結石 (%)	1 (0.3)	3 (0.8)	29 (7.9)	185 (50.5)	98 (26.8)	35 (9.6)	14 (3.8)	1 (0.3)		366 (100.0)	18	384	75.49	13.78
腎・尿路腫瘍 (%)			56 (9.0)	282 (45.6)	174 (28.1)	66 (10.7)	40 (6.5)	1 (0.2)		619 (100.0)	25	644	77.09	13.29
閉塞性尿路障害 (%)	1 (0.2)	2 (0.5)	23 (5.2)	207 (46.8)	106 (24.0)	66 (14.9)	35 (7.9)	1 (0.2)	1 (0.2)	442 (100.0)	23	465	79.10	14.57
骨髄腫 (%)		1 (0.5)	22 (11.0)	104 (52.0)	55 (27.5)	14 (7.0)	4 (2.0)			200 (100.0)	13	213	74.36	12.57
腎形成不全 (%)	2 (0.6)	2 (0.6)	19 (5.4)	139 (39.8)	95 (27.2)	58 (16.6)	30 (8.6)	4 (1.1)		349 (100.0)	19	368	80.51	15.87
不明 (%)	6 (0.0)	82 (0.4)	1,982 (10.4)	9,148 (48.0)	4,374 (22.9)	2,327 (12.2)	1,072 (5.6)	74 (0.4)	6 (0.0)	19,071 (100.0)	1,407	20,478	76.56	14.54
再導入 (%)	1 (0.1)	3 (0.3)	69 (6.2)	463 (41.8)	293 (26.4)	160 (14.4)	110 (9.9)	8 (0.7)	1 (0.1)	1,108 (100.0)	56	1,164	80.17	15.23
その他 (%)	3 (0.1)	32 (0.6)	530 (10.4)	2,343 (46.0)	1,141 (22.4)	666 (13.1)	355 (7.0)	17 (0.3)	2 (0.0)	5,089 (100.0)	317	5,406	76.96	15.22
合計 (%)	66 (0.0)	678 (0.3)	17,611 (8.9)	92,943 (47.2)	47,450 (24.1)	25,249 (12.8)	12,149 (6.2)	834 (0.4)	53 (0.0)	197,033 (100.0)	12,503	209,536	77.36	14.40
記載なし (%)														
総計 (%)	66 (0.0)	678 (0.3)	17,611 (8.9)	92,943 (47.2)	47,450 (24.1)	25,249 (12.8)	12,149 (6.2)	834 (0.4)	53 (0.0)	197,033 (100.0)	12,503	209,536	77.36	14.40

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4823##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査