

表 1346 透析前拡張期血圧(mmHg) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	20未満	20 ~	40 ~	60 ~	80 ~	90 ~	100 ~	120 ~	140 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	20 (0.0)	124 (0.3)	2,809 (6.7)	17,558 (41.8)	10,932 (26.1)	6,706 (16.0)	3,528 (8.4)	263 (0.6)	18 (0.0)	41,958 (100.0)	2,187 (100.0)	44,145 (100.0)	80.03	14.72
女性 (%)	6 (0.0)	122 (0.5)	2,154 (9.4)	10,774 (46.9)	5,619 (24.5)	2,828 (12.3)	1,356 (5.9)	76 (0.3)	13 (0.1)	22,948 (100.0)	1,281 (100.0)	24,229 (100.0)	77.16	14.56
合計 (%)	26 (0.0)	246 (0.4)	4,963 (7.6)	28,332 (43.7)	16,551 (25.5)	9,534 (14.7)	4,884 (7.5)	339 (0.5)	31 (0.0)	64,906 (100.0)	3,468 (100.0)	68,374 (100.0)	79.02	14.73
記載なし (%)														
総計 (%)	26 (0.0)	246 (0.4)	4,963 (7.6)	28,332 (43.7)	16,551 (25.5)	9,534 (14.7)	4,884 (7.5)	339 (0.5)	31 (0.0)	64,906 (100.0)	3,468 (100.0)	68,374 (100.0)	79.02	14.73

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4830##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査