

表 1349 透析前拡張期血圧(mmHg) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	20未満	20~	40~	60~	80~	90~	100~	120~	140~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性系球体腎炎	8 (%)	100 (0.5)	1,536 (7.2)	9,020 (42.4)	5,671 (26.7)	3,228 (15.2)	1,593 (7.5)	98 (0.5)	6 (0.0)	21,260 (100.0)	1,128	22,388	79.30	14.62
慢性腎盂腎炎	3 (%)	52 (8.9)	243 (41.5)	144 (24.6)	89 (15.2)	46 (7.9)	7 (1.2)	1 (0.2)	585 (100.0)	42	627	79.33	15.72	
急速進行性系球体腎炎	1 (%)	40 (8.5)	210 (44.6)	120 (25.5)	66 (14.0)	34 (7.2)			471 (100.0)	13	484	78.83	14.09	
妊娠腎/妊娠中毒症	1 (%)	5 (1.2)	40 (9.4)	192 (45.1)	100 (23.5)	58 (13.6)	30 (7.0)		426 (100.0)	33	459	77.10	15.03	
その他の分類不能の腎炎		24 (7.2)	139 (41.9)	86 (25.9)	55 (16.6)	26 (7.8)	1 (0.3)	1 (0.3)	332 (100.0)	23	355	79.72	14.53	
多発性囊胞腎	3 (%)	151 (6.1)	1,052 (42.8)	682 (27.7)	396 (16.1)	173 (7.0)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,460 (100.0)	109	2,569	79.93	13.38	
腎硬化症	3 (%)	22 (0.4)	541 (9.6)	2,632 (46.9)	1,322 (23.5)	715 (12.7)	357 (6.4)	23 (0.4)	5,617 (0.0)	279	5,896	77.19	14.72	
悪性高血圧	3 (%)	27 (0.6)	191 (5.1)	133 (35.9)	108 (25.0)	61 (20.3)	8 (11.5)	1 (1.5)	532 (0.2)	23	555	82.91	15.88	
糖尿病性腎症	12 (%)	65 (0.3)	1,762 (7.6)	10,350 (44.4)	5,834 (25.0)	3,344 (14.3)	1,824 (7.8)	131 (0.6)	10 (0.0)	23,332 (100.0)	1,184	24,516	79.05	14.71
SLE腎炎	4 (%)	40 (0.8)	225 (7.9)	117 (44.6)	68 (23.2)	45 (13.5)	6 (8.9)	505 (1.2)	32 (100.0)	537	537	78.87	15.71	
アミロイド腎	1 (%)	14 (1.1)	37 (15.2)	27 (40.2)	8 (29.3)	4 (8.7)		1 (4.3)	92 (1.1)	6	98	76.33	17.39	
痛風腎	2 (%)	12 (0.9)	95 (5.7)	54 (45.0)	37 (25.6)	9 (17.5)	2 (4.3)		211 (0.9)	16	227	78.41	14.20	
先天性代謝異常による腎不全	1 (%)	5 (1.4)	18 (7.1)	21 (25.7)	21 (30.0)	8 (22.9)	8 (11.4)	1 (1.4)	70 (100.0)	3	73	83.54	17.07	
腎・尿路結核	1 (%)	7 (2.4)	19 (17.1)	8 (46.3)	6 (19.5)	6 (14.6)			41 (100.0)	3	44	71.12	16.33	
腎・尿路結石		14 (12.8)	47 (43.1)	23 (21.1)	19 (17.4)	5 (4.6)	1 (0.9)		109 (100.0)	4	113	77.39	14.54	
腎・尿路腫瘍		20 (11.1)	85 (47.2)	44 (24.4)	27 (15.0)	4 (2.2)			180 (100.0)	10	190	76.14	13.55	
閉塞性尿路障害	1 (%)	63 (0.7)	63 (5.5)	45 (43.2)	16 (30.8)	11 (11.0)	2 (7.5)	2 (1.4)	146 (100.0)	5	151	80.10	14.76	
骨髄腫		8 (22.2)	16 (44.4)	9 (25.0)	3 (8.3)				36 (100.0)	1	37	71.33	13.31	
腎形成不全		55 (6.7)	44 (33.3)	34 (26.7)	18 (20.6)	3 (10.9)			165 (100.0)	6	171	83.06	15.78	
不明	2 (%)	471 (0.3)	2,698 (7.7)	1,509 (44.4)	875 (24.8)	464 (14.4)	38 (7.6)	4 (0.6)	6,080 (0.1)	451	6,531	78.89	14.89	
再導入	3 (%)	42 (0.5)	232 (6.9)	150 (38.3)	125 (24.8)	53 (20.6)	1 (8.7)		606 (0.2)	27	633	80.84	14.99	
その他	12 (%)	138 (0.7)	713 (8.4)	408 (43.2)	241 (24.7)	119 (14.6)	15 (7.2)	4 (0.9)	1,650 (0.2)	70	1,720	79.01	15.55	
合計	26 (%)	246 (0.4)	4,963 (7.6)	28,332 (43.7)	16,551 (25.5)	9,534 (14.7)	4,884 (7.5)	339 (0.5)	64,906 (0.0)	3,468	68,374	79.02	14.73	
記載なし														
総計	26 (%)	246 (0.4)	4,963 (7.6)	28,332 (43.7)	16,551 (25.5)	9,534 (14.7)	4,884 (7.5)	339 (0.5)	64,906 (0.0)	3,468	68,374	79.02	14.73	

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4833##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査