

表 1356 透析前脈拍(拍/分) 治療方法別 (透析患者全体)

| 治療方法   | 40未満       | 40~            | 50~             | 60~              | 70~              | 80~              | 90~              | 100~           | 110~           | 120~         | 合計                 | 記載なし              | 総計                 | 平均    | 標準偏差  |
|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|
| 施設血液透析 | 147<br>(%) | 2,187<br>(0.1) | 17,511<br>(1.1) | 52,549<br>(8.8)  | 62,735<br>(26.4) | 39,869<br>(31.5) | 17,021<br>(20.0) | 5,159<br>(8.6) | 1,202<br>(2.6) | 494<br>(0.6) | 198,874<br>(0.2)   | 34,830<br>(100.0) | 233,704<br>(100.0) | 74.43 | 12.73 |
| 血液透析濾過 | 45<br>(%)  | 567<br>(0.1)   | 5,157<br>(0.9)  | 16,364<br>(8.0)  | 20,102<br>(25.3) | 13,956<br>(31.1) | 5,935<br>(21.6)  | 1,887<br>(9.2) | 453<br>(2.9)   | 195<br>(0.7) | 64,661<br>(0.3)    | 10,138<br>(100.0) | 74,799<br>(100.0)  | 75.25 | 12.83 |
| 血液濾過   |            |                |                 | 4                | 3                | 2                | 1                | 2              |                |              | 12                 | 7                 | 19                 | 79.25 | 14.12 |
| 血液吸着透析 | 2<br>(%)   | 11<br>(0.2)    | 88<br>(0.9)     | 332<br>(7.3)     | 384<br>(27.6)    | 242<br>(32.0)    | 95<br>(20.1)     | 29<br>(7.9)    | 14<br>(2.4)    | 4<br>(1.2)   | 1,201<br>(0.3)     | 154<br>(100.0)    | 1,355<br>(100.0)   | 74.77 | 12.76 |
| 在宅血液透析 |            | 1<br>(0.2)     | 13<br>(3.2)     | 78<br>(19.4)     | 133<br>(33.0)    | 96<br>(23.8)     | 49<br>(12.2)     | 23<br>(5.7)    | 7<br>(1.7)     | 3<br>(0.7)   | 403<br>(0.0)       | 214<br>(100.0)    | 617<br>(100.0)     | 79.09 | 13.25 |
| 腹膜透析   | 1<br>(%)   | 18<br>(0.0)    | 250<br>(0.4)    | 925<br>(5.4)     | 1,425<br>(20.0)  | 1,147<br>(30.8)  | 598<br>(24.8)    | 189<br>(12.9)  | 51<br>(4.1)    | 22<br>(1.1)  | 4,626<br>(0.5)     | 3,989<br>(100.0)  | 8,615<br>(100.0)   | 78.05 | 13.09 |
| 合計     | 195<br>(%) | 2,784<br>(1.0) | 23,019<br>(8.5) | 70,252<br>(26.0) | 84,782<br>(31.4) | 55,312<br>(20.5) | 23,699<br>(8.8)  | 7,289<br>(2.7) | 1,727<br>(0.6) | 718<br>(0.3) | 269,777<br>(100.0) | 49,332<br>(100.0) | 319,109<br>(100.0) | 74.70 | 12.77 |
| 記載なし   |            |                |                 |                  |                  |                  |                  |                |                |              |                    |                   |                    |       |       |
| 総計     | 195<br>(%) | 2,784<br>(1.0) | 23,019<br>(8.5) | 70,252<br>(26.0) | 84,782<br>(31.4) | 55,312<br>(20.5) | 23,699<br>(8.8)  | 7,289<br>(2.7) | 1,727<br>(0.6) | 718<br>(0.3) | 269,777<br>(100.0) | 49,332<br>(100.0) | 319,109<br>(100.0) | 74.70 | 12.77 |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4910##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査