

表 1362 透析前脈拍(拍/分) 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	40未満	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	110~	120~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	49 (%) (0.1)	731 (0.9)	7,038 (9.1)	21,677 (28.0)	24,732 (31.9)	14,699 (19.0)	5,935 (7.7)	1,909 (2.5)	477 (0.6)	189 (0.2)	77,436 (100.0)	14,347	91,783	73.95	12.55
慢性腎盂腎炎	2 (%) (0.1)	16 (0.6)	195 (7.9)	638 (25.9)	772 (31.3)	527 (21.4)	227 (9.2)	65 (2.6)	16 (0.6)	7 (0.3)	2,465 (100.0)	431	2,896	75.07	12.53
急速進行性糸球体腎炎	2 (%) (0.1)	20 (0.9)	157 (7.2)	553 (25.4)	695 (31.9)	458 (21.0)	198 (9.1)	77 (3.5)	14 (0.6)	7 (0.3)	2,181 (100.0)	357	2,538	75.55	12.84
妊娠腎/妊娠中毒症	1 (%) (0.1)	9 (0.7)	78 (6.1)	346 (26.9)	445 (34.6)	249 (19.4)	106 (8.2)	39 (3.0)	8 (0.6)	4 (0.3)	1,285 (100.0)	198	1,483	75.17	12.48
その他の分類不能の腎炎	3 (%) (0.2)	14 (1.1)	88 (7.0)	321 (25.7)	409 (32.7)	259 (20.7)	103 (8.2)	36 (2.9)	16 (1.3)	1 (0.1)	1,250 (100.0)	204	1,454	75.16	12.69
多発性囊胞腎	3 (%) (0.0)	91 (0.9)	934 (9.5)	2,856 (29.1)	3,166 (32.3)	1,788 (18.2)	678 (6.9)	223 (2.3)	51 (0.5)	20 (0.2)	9,810 (100.0)	1,661	11,471	73.43	12.36
腎硬化症	27 (%) (0.1)	402 (1.5)	3,185 (11.8)	7,936 (29.5)	8,063 (29.9)	4,668 (17.3)	1,857 (6.9)	582 (2.2)	143 (0.5)	65 (0.2)	26,928 (100.0)	4,722	31,650	72.62	12.75
悪性高血圧	19 (%) (0.8)	212 (9.3)	591 (25.9)	679 (29.7)	488 (21.4)	204 (8.9)	70 (3.1)	17 (0.7)	4 (0.2)	2,284 (100.0)	437	2,721	74.81	12.73	
糖尿病性腎症	79 (%) (0.1)	1,034 (1.0)	7,570 (7.2)	24,359 (23.3)	32,918 (31.4)	23,818 (22.7)	10,836 (10.3)	3,153 (3.0)	682 (0.7)	285 (0.3)	104,734 (100.0)	18,923	123,657	75.89	12.80
SLE腎炎	15 (%) (0.8)	103 (5.5)	483 (25.6)	600 (31.8)	427 (22.7)	169 (9.0)	64 (3.4)	19 (1.0)	4 (0.2)	1,884 (100.0)	338	2,222	76.08	12.61	
アミロイド腎	1 (%) (0.3)	15 (4.0)	102 (27.2)	120 (32.0)	94 (25.1)	26 (6.9)	13 (3.5)	4 (1.1)	4 (1.0)	375 (100.0)	63	438	75.99	11.88	
痛風腎	1 (%) (0.1)	9 (1.0)	86 (9.6)	248 (27.6)	285 (31.7)	166 (18.5)	72 (8.0)	20 (2.2)	9 (1.0)	3 (0.3)	899 (100.0)	157	1,056	74.09	12.87
先天性代謝異常による腎不全	5 (%) (2.0)	14 (5.7)	53 (21.7)	76 (31.1)	60 (24.6)	24 (9.8)	9 (3.7)	3 (1.2)	3 (1.0)	244 (100.0)	37	281	76.24	12.92	
腎・尿路結核	1 (%) (0.7)	15 (10.6)	37 (26.2)	45 (31.9)	30 (21.3)	10 (7.1)	3 (2.1)	3 (1.0)	1 (0.2)	141 (100.0)	27	168	73.24	11.55	
腎・尿路結石	6 (%) (1.2)	38 (7.6)	145 (29.2)	152 (30.6)	96 (19.3)	38 (7.6)	15 (3.0)	6 (1.2)	1 (0.2)	497 (100.0)	81	578	74.31	12.91	
腎・尿路腫瘍	1 (%) (0.1)	8 (1.0)	82 (10.0)	217 (26.4)	248 (30.1)	172 (20.9)	63 (7.7)	23 (2.8)	4 (0.5)	5 (0.6)	823 (100.0)	136	959	73.99	13.21
閉塞性尿路障害	1 (%) (0.2)	4 (0.6)	47 (7.3)	172 (26.7)	196 (30.4)	144 (22.4)	63 (9.8)	14 (2.2)	3 (0.5)	644 (100.0)	99	743	75.12	12.08	
骨髄腫	2 (%) (0.7)	29 (10.7)	69 (25.6)	85 (31.5)	59 (21.9)	22 (8.1)	3 (1.1)	1 (0.4)	1 (0.0)	270 (100.0)	53	323	73.97	11.82	
腎形成不全	2 (%) (0.4)	29 (5.4)	114 (21.0)	166 (30.6)	137 (25.3)	66 (12.2)	18 (3.3)	6 (1.1)	4 (0.7)	542 (100.0)	122	664	77.66	12.88	
不明	16 (%) (0.1)	294 (1.1)	2,408 (9.2)	7,154 (27.3)	8,101 (30.9)	5,134 (19.6)	2,158 (8.2)	680 (2.6)	185 (0.7)	80 (0.3)	26,210 (100.0)	5,202	31,412	74.24	12.87
再導入	4 (%) (0.2)	12 (0.7)	120 (6.6)	418 (23.1)	592 (32.7)	399 (22.0)	187 (10.3)	55 (3.0)	19 (1.0)	5 (0.3)	1,811 (100.0)	363	2,174	76.12	12.81
その他	6 (%) (0.1)	89 (1.3)	576 (8.2)	1,763 (25.0)	2,237 (31.7)	1,440 (20.4)	657 (9.3)	218 (3.1)	45 (0.6)	33 (0.5)	7,064 (100.0)	1,374	8,438	75.13	13.27
合計	195 (%) (0.1)	2,784 (1.0)	23,019 (8.5)	70,252 (26.0)	84,782 (31.4)	55,312 (20.5)	23,699 (8.8)	7,289 (2.7)	1,727 (0.6)	718 (0.3)	269,777 (100.0)	49,332	319,109	74.70	12.77
記載なし															
総計	195 (%) (0.1)	2,784 (1.0)	23,019 (8.5)	70,252 (26.0)	84,782 (31.4)	55,312 (20.5)	23,699 (8.8)	7,289 (2.7)	1,727 (0.6)	718 (0.3)	269,777 (100.0)	49,332	319,109	74.70	12.77

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4916##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査