

表 1364 透析前脈拍(拍/分) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	106 (0.1)	1,594 (1.3)	11,857 (9.6)	32,839 (26.6)	37,604 (30.5)	24,319 (19.7)	10,744 (8.7)	3,273 (2.7)	798 (0.6)	278 (0.2)	123,412 (100.0)	12,038	135,450	74.21	12.95
女性 (%)	33 (0.0)	513 (0.8)	4,958 (7.3)	17,583 (26.0)	22,708 (33.6)	14,004 (20.7)	5,600 (8.3)	1,676 (2.5)	354 (0.5)	187 (0.3)	67,616 (100.0)	6,469	74,085	74.83	12.27
合計 (%)	139 (0.1)	2,107 (1.1)	16,815 (8.8)	50,422 (26.4)	60,312 (31.6)	38,323 (20.1)	16,344 (8.6)	4,949 (2.6)	1,152 (0.6)	465 (0.2)	191,028 (100.0)	18,507	209,535	74.43	12.72
記載なし (%)			1 (100.0)								1 (100.0)		1	59.00	
総計 (%)	139 (0.1)	2,107 (1.1)	16,816 (8.8)	50,422 (26.4)	60,312 (31.6)	38,323 (20.1)	16,344 (8.6)	4,949 (2.6)	1,152 (0.6)	465 (0.2)	191,029 (100.0)	18,507	209,536	74.43	12.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4920##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査