

表 1369 透析前脈拍(拍/分) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	31	431	3,487	10,361	12,307	8,666	3,788	1,230	301	133	40,735	3,410	44,145	75.11	13.11
(%)	(0.1)	(1.1)	(8.6)	(25.4)	(30.2)	(21.3)	(9.3)	(3.0)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				
女性	13	120	1,538	5,573	7,294	4,930	1,994	608	139	59	22,268	1,961	24,229	75.52	12.30
(%)	(0.1)	(0.5)	(6.9)	(25.0)	(32.8)	(22.1)	(9.0)	(2.7)	(0.6)	(0.3)	(100.0)				
合計	44	551	5,025	15,934	19,601	13,596	5,782	1,838	440	192	63,003	5,371	68,374	75.25	12.83
(%)	(0.1)	(0.9)	(8.0)	(25.3)	(31.1)	(21.6)	(9.2)	(2.9)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	44	551	5,025	15,934	19,601	13,596	5,782	1,838	440	192	63,003	5,371	68,374	75.25	12.83
(%)	(0.1)	(0.9)	(8.0)	(25.3)	(31.1)	(21.6)	(9.2)	(2.9)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4930##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査