

表 1386 現在施行中のPD歴(年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	1年未満	1年～	2年～	4年～	6年～	8年～	10年～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	756 (59.6)	624 (56.0)	729 (57.4)	339 (57.4)	141 (59.2)	58 (65.2)	66 (64.7)	2,713 (58.0)	1,423 (63.0)	4,136 (59.7)	2.67	2.67
腹膜透析 (APD) (%)	414 (32.6)	397 (35.6)	404 (31.8)	174 (29.4)	60 (25.2)	21 (23.6)	21 (20.6)	1,491 (31.9)	627 (27.8)	2,118 (30.6)	2.42	2.34
腹膜透析 (CCPD) (%)	99 (7.8)	94 (8.4)	137 (10.8)	78 (13.2)	37 (15.5)	10 (11.2)	15 (14.7)	470 (10.1)	207 (9.2)	677 (9.8)	3.19	3.05
合計 (%)	1,269 (100.0)	1,115 (100.0)	1,270 (100.0)	591 (100.0)	238 (100.0)	89 (100.0)	102 (100.0)	4,674 (100.0)	2,257 (100.0)	6,931 (100.0)	2.64	2.62
記載なし												
総計	1,269	1,115	1,270	591	238	89	102	4,674	2,257	6,931	2.64	2.62

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5020##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査