

表 1405 使用透析液の種類 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	1.5%液のみ (イコテキストリンなし)	1.5%液と 2.5%液の併用 (イコテキストリンなし)	2.5%液のみ (イコテキストリンなし)	4.25%液のみ (イコテキストリンなし)	イコテキストリン 単独 (ブドウ糖 使用なし)	1.5%液+ イコテキストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコテキストリン	2.5%液+ イコテキストリン	4.25%液+ イコテキストリン	合計	不明	記載なし	総計
PD単独 (%)	2,017 (42.2)	472 (9.9)	118 (2.5)	5 (0.1)	57 (1.2)	1,278 (26.8)	457 (9.6)	365 (7.6)	7 (0.1)	4,776 (100.0)	13	2,142	6,931
PD.HD併用週1HD(F) (%)	149 (15.5)	170 (17.7)	36 (3.8)		2 (0.2)	249 (25.9)	209 (21.8)	145 (15.1)		960 (100.0)	2	534	1,496
PD.HD併用週2HD(F) (%)	16 (18.8)	28 (32.9)	7 (8.2)			15 (17.6)	11 (12.9)	8 (9.4)		85 (100.0)		35	120
PD.HD併用週3HD(F) (%)													
PD.HD併用週4HD(F) (%)													
PD.HD併用その他 (%)	4 (11.8)	4 (11.8)				7 (20.6)	11 (32.4)	8 (23.5)		34 (100.0)	1	14	49
合計 (%)	2,186 (37.3)	674 (11.5)	161 (2.7)	5 (0.1)	59 (1.0)	1,549 (26.5)	688 (11.8)	526 (9.0)	7 (0.1)	5,855 (100.0)	16	2,725	8,596
不明 (%)								1 (100.0)		1 (100.0)		3	4
記載なし (%)												15	15
総計 (%)	2,186 (37.3)	674 (11.5)	161 (2.7)	5 (0.1)	59 (1.0)	1,549 (26.5)	688 (11.7)	527 (9.0)	7 (0.1)	5,856 (100.0)	16	2,743	8,615

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5211##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査