

表 1406 使用透析液の種類 性別 (腹膜透析患者)

性別	1.5%液 のみ (イコデ'キストリン なし)	1.5%液と 2.5%液の 併用 (イコデ'キストリン なし)	2.5%液 のみ (イコデ'キストリン なし)	4.25%液 のみ (イコデ'キストリン なし)	イコデ'キストリン 単独 (ブドウ糖 使用なし)	1.5%液+ イコデ'キストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコデ'キストリン	2.5%液+ イコデ'キストリン	4.25%液+ イコデ'キストリン	合計	不明	記載なし	総計
男性	1,412 (%)	422 (11.1)	96 (2.5)	2 (0.1)	34 (0.9)	1,069 (28.1)	439 (11.6)	322 (8.5)	2 (0.1)	3,798 (100.0)	14	1,790	5,602
女性	774 (%)	252 (12.2)	65 (3.2)	3 (0.1)	25 (1.2)	480 (23.3)	249 (12.1)	205 (10.0)	5 (0.2)	2,058 (100.0)	2	953	3,013
合計	2,186 (%)	674 (11.5)	161 (2.7)	5 (0.1)	59 (1.0)	1,549 (26.5)	688 (11.7)	527 (9.0)	7 (0.1)	5,856 (100.0)	16	2,743	8,615
記載なし (%)													
総計	2,186 (%)	674 (11.5)	161 (2.7)	5 (0.1)	59 (1.0)	1,549 (26.5)	688 (11.7)	527 (9.0)	7 (0.1)	5,856 (100.0)	16	2,743	8,615

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D5212##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査