

表 1407 使用透析液の種類 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	1.5%液のみ (イコデキストリンなし)	1.5%液と 2.5%液の併用 (イコデキストリンなし)	2.5%液のみ (イコデキストリンなし)	4.25%液のみ (イコデキストリンなし)	イコデキストリン 単独 (ブドウ糖 使用なし)	1.5%液+ イコデキストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコデキストリン	2.5%液+ イコデキストリン	4.25%液+ イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	15 (25.0)	22 (36.7)	2 (3.3)	2 (3.3)		4 (6.7)	5 (8.3)	3 (5.0)	7 (11.7)	60 (100.0)		25	85
15歳~ (%)	23 (37.7)	12 (19.7)	2 (3.3)			11 (18.0)	9 (14.8)	4 (6.6)		61 (100.0)		33	94
30歳~ (%)	156 (38.2)	59 (14.5)	13 (3.2)	2 (0.5)	2 (0.5)	104 (25.5)	38 (9.3)	34 (8.3)		408 (100.0)		200	608
45歳~ (%)	534 (35.2)	151 (10.0)	45 (3.0)			14 (0.9)	391 (25.8)	220 (14.5)	162 (10.7)	1,517 (100.0)	4	762	2,283
60歳~ (%)	998 (38.8)	298 (11.6)	55 (2.1)	1 (0.0)	15 (0.6)	693 (27.0)	302 (11.8)	207 (8.1)		2,569 (100.0)	10	1,139	3,718
75歳~ (%)	437 (37.5)	125 (10.7)	40 (3.4)			24 (2.1)	325 (27.9)	108 (9.3)	106 (9.1)	1,165 (100.0)	2	534	1,701
90歳~ (%)	23 (30.3)	7 (9.2)	4 (5.3)			4 (5.3)	21 (27.6)	6 (7.9)	11 (14.5)	76 (100.0)		50	126
合計 (%)	2,186 (37.3)	674 (11.5)	161 (2.7)	5 (0.1)	59 (1.0)	1,549 (26.5)	688 (11.7)	527 (9.0)	7 (0.1)	5,856 (100.0)	16	2,743	8,615
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	2,186 (37.3)	674 (11.5)	161 (2.7)	5 (0.1)	59 (1.0)	1,549 (26.5)	688 (11.7)	527 (9.0)	7 (0.1)	5,856 (100.0)	16	2,743	8,615
平均	63.61	61.15	63.89	28.80	71.15	64.10	62.26	62.91	6.43	63.22	63.88	63.02	63.16
標準偏差	13.89	17.10	15.92	27.77	14.85	13.31	13.57	14.05	4.16	14.42	9.53	14.65	14.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D5213##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査