

表 1408 使用透析液の種類 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析患者)

PD歴	1.5%液のみ (イコデキストリンなし)	1.5%液と 2.5%液の併用 (イコデキストリンなし)	2.5%液のみ (イコデキストリンなし)	4.25%液のみ (イコデキストリンなし)	イコデキストリン 単独 (フドウ糖 使用なし)	1.5%液+ イコデキストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコデキストリン	2.5%液+ イコデキストリン	4.25%液+ イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
1年未満	700 (%) (56.1)	71 (5.7)	33 (2.6)		21 (1.7)	319 (25.6)	38 (3.0)	66 (5.3)		1,248	5	59	1,312
1年~	474 (%) (40.1)	103 (8.7)	28 (2.4)		20 (1.7)	352 (29.8)	111 (9.4)	94 (7.9)	1 (0.1)	1,183	4	20	1,207
2年~	521 (%) (35.1)	155 (10.4)	35 (2.4)	2 (0.1)	9 (0.6)	414 (27.9)	190 (12.8)	154 (10.4)	4 (0.3)	1,484	4	30	1,518
4年~	234 (%) (28.8)	104 (12.8)	23 (2.8)	1 (0.1)	4 (0.5)	234 (28.8)	131 (16.1)	82 (10.1)		813	1	8	822
6年~	100 (%) (25.0)	69 (17.3)	12 (3.0)		2 (0.5)	102 (25.5)	71 (17.8)	43 (10.8)	1 (0.3)	400		7	407
8年~	36 (%) (20.2)	40 (22.5)	1 (0.6)			30 (16.9)	46 (25.8)	24 (13.5)	1 (0.6)	178	1	3	182
10年~	34 (%) (15.9)	57 (26.6)	15 (7.0)	1 (0.5)		38 (17.8)	47 (22.0)	22 (10.3)		214		2	216
合計	2,099 (%) (38.0)	599 (10.9)	147 (2.7)	4 (0.1)	56 (1.0)	1,489 (27.0)	634 (11.5)	485 (8.8)	7 (0.1)	5,520	15	129	5,664
記載なし	87 (%) (25.9)	75 (22.3)	14 (4.2)	1 (0.3)	3 (0.9)	60 (17.9)	54 (16.1)	42 (12.5)		336	1	2,614	2,951
総計	2,186 (%) (37.3)	674 (11.5)	161 (2.7)	5 (0.1)	59 (1.0)	1,549 (26.5)	688 (11.7)	527 (9.0)	7 (0.1)	5,856 (100.0)	16	2,743	8,615
平均	2.40	4.63	3.89	6.06	1.64	2.94	4.57	3.74	4.14	3.19	2.09	2.17	3.17
標準偏差	2.51	4.01	4.17	5.82	1.63	2.58	3.54	3.18	2.80	3.09	2.18	2.77	3.08

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5214##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査