

表 1410 使用透析液の種類 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	1.5%液のみ (イコデ'キストリンなし)	1.5%液と 2.5%液の併用 (イコデ'キストリンなし)	2.5%液のみ (イコデ'キストリンなし)	4.25%液のみ (イコデ'キストリンなし)	イコデ'キストリン 単独 (フ'ドウ糖 使用なし)	1.5%液+ イコデ'キストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコデ'キストリン	2.5%液+ イコデ'キストリン	4.25%液+ イコデ'キストリン	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	129	25	3		5	108	33	22		325		231	556
(%)	(39.7)	(7.7)	(0.9)		(1.5)	(33.2)	(10.2)	(6.8)		(100.0)			
私立大学	325	70	20		6	157	58	60		696	7	446	1,149
(%)	(46.7)	(10.1)	(2.9)		(0.9)	(22.6)	(8.3)	(8.6)		(100.0)			
国立病院機構等	73	12	4		1	53	20	17	4	184		43	227
(%)	(39.7)	(6.5)	(2.2)		(0.5)	(28.8)	(10.9)	(9.2)	(2.2)	(100.0)			
県市町村立・国保	407	109	32	3	10	314	138	97	3	1,113	2	485	1,600
(%)	(36.6)	(9.8)	(2.9)	(0.3)	(0.9)	(28.2)	(12.4)	(8.7)	(0.3)	(100.0)			
JCHO(旧社会保険)等	80	19	3		8	48	11	8		177		319	496
(%)	(45.2)	(10.7)	(1.7)		(4.5)	(27.1)	(6.2)	(4.5)		(100.0)			
厚生連等	119	56	15		4	122	48	35		399		152	551
(%)	(29.8)	(14.0)	(3.8)		(1.0)	(30.6)	(12.0)	(8.8)		(100.0)			
その他公的	359	84	21		9	305	96	69		943		384	1,327
(%)	(38.1)	(8.9)	(2.2)		(1.0)	(32.3)	(10.2)	(7.3)		(100.0)			
私立総合	116	76	15		2	51	46	39		345		48	393
(%)	(33.6)	(22.0)	(4.3)		(0.6)	(14.8)	(13.3)	(11.3)		(100.0)			
私立	403	162	38	2	6	273	158	130		1,172	3	451	1,626
(%)	(34.4)	(13.8)	(3.2)	(0.2)	(0.5)	(23.3)	(13.5)	(11.1)		(100.0)			
私立診療所	175	61	10		8	118	80	50		502	4	184	690
(%)	(34.9)	(12.2)	(2.0)		(1.6)	(23.5)	(15.9)	(10.0)		(100.0)			
総計	2,186	674	161	5	59	1,549	688	527	7	5,856	16	2,743	8,615
(%)	(37.3)	(11.5)	(2.7)	(0.1)	(1.0)	(26.5)	(11.7)	(9.0)	(0.1)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D5216##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査