

表 1413 使用透析液の種類 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	1.5%液のみ (イコデキストリンなし)	1.5%液と 2.5%液の併用 (イコデキストリンなし)	2.5%液のみ (イコデキストリンなし)	4.25%液のみ (イコデキストリンなし)	イコデキストリン 単独 (ブドウ糖使用なし)	1.5%液+ イコデキストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコデキストリン	2.5%液+ イコデキストリン	4.25%液+ イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	15 (25.0)	22 (36.7)	2 (3.3)	2 (3.3)		4 (6.7)	5 (8.3)	3 (5.0)	7 (11.7)	60 (100.0)		25	85
15歳~ (%)	23 (43.4)	12 (22.6)	2 (3.8)			6 (11.3)	7 (13.2)	3 (5.7)		53 (100.0)		26	79
30歳~ (%)	142 (46.1)	35 (11.4)	7 (2.3)	2 (0.6)	2 (0.6)	78 (25.3)	21 (6.8)	21 (6.8)		308 (100.0)		151	459
45歳~ (%)	480 (42.7)	97 (8.6)	27 (2.4)		13 (1.2)	288 (25.6)	128 (11.4)	91 (8.1)		1,124 (100.0)	2	524	1,650
60歳~ (%)	919 (43.7)	197 (9.4)	41 (1.9)	1 (0.0)	15 (0.7)	582 (27.6)	202 (9.6)	148 (7.0)		2,105 (100.0)	9	882	2,996
75歳~ (%)	416 (39.4)	103 (9.8)	35 (3.3)		23 (2.2)	300 (28.4)	89 (8.4)	89 (8.4)		1,055 (100.0)	2	485	1,542
90歳~ (%)	22 (31.0)	6 (8.5)	4 (5.6)		4 (5.6)	20 (28.2)	5 (7.0)	10 (14.1)		71 (100.0)		49	120
合計 (%)	2,017 (42.2)	472 (9.9)	118 (2.5)	5 (0.1)	57 (1.2)	1,278 (26.8)	457 (9.6)	365 (7.6)	7 (0.1)	4,776 (100.0)	13	2,142	6,931
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	2,017 (42.2)	472 (9.9)	118 (2.5)	5 (0.1)	57 (1.2)	1,278 (26.8)	457 (9.6)	365 (7.6)	7 (0.1)	4,776 (100.0)	13	2,142	6,931
平均	63.75	61.14	65.78	28.80	71.19	65.21	63.31	64.53	6.43	63.92	65.69	64.00	63.95
標準偏差	14.07	18.94	16.73	27.77	14.73	13.29	14.45	14.68	4.16	14.86	9.45	15.28	14.98

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#DD5222##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査