

表 1414 使用透析液の種類 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

PD歴	1.5%液のみ (イコテキストリンなし)	1.5%液と 2.5%液の併用 (イコテキストリンなし)	2.5%液のみ (イコテキストリンなし)	4.25%液のみ (イコテキストリンなし)	イコテキストリン 単独 (ブドウ糖 使用なし)	1.5%液+ イコテキストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコテキストリン	2.5%液+ イコテキストリン	4.25%液+ イコテキストリン	合計	不明	記載なし	総計
1年未満	694 (%) (57.5)	65 (5.4)	31 (2.6)		19 (1.6)	310 (25.7)	31 (2.6)	58 (4.8)		1,208 (100.0)	5	56	1,269
1年~	462 (%) (42.2)	90 (8.2)	26 (2.4)		20 (1.8)	327 (29.9)	95 (8.7)	74 (6.8)	1 (0.1)	1,095 (100.0)	3	17	1,115
2年~	484 (%) (39.0)	123 (9.9)	29 (2.3)	2 (0.2)	9 (0.7)	338 (27.3)	142 (11.5)	109 (8.8)	4 (0.3)	1,240 (100.0)	3	27	1,270
4年~	199 (%) (34.0)	75 (12.8)	12 (2.1)	1 (0.2)	4 (0.7)	166 (28.4)	82 (14.0)	46 (7.9)		585 (100.0)	1	5	591
6年~	75 (%) (31.6)	35 (14.8)	4 (1.7)		2 (0.8)	56 (23.6)	40 (16.9)	24 (10.1)	1 (0.4)	237 (100.0)		1	238
8年~	23 (%) (25.8)	20 (22.5)	1 (1.1)			15 (16.9)	16 (18.0)	13 (14.6)	1 (1.1)	89 (100.0)			89
10年~	15 (%) (14.7)	34 (33.3)	7 (6.9)	1 (1.0)		14 (13.7)	18 (17.6)	13 (12.7)		102 (100.0)			102
合計	1,952 (%) (42.8)	442 (9.7)	110 (2.4)	4 (0.1)	54 (1.2)	1,226 (26.9)	424 (9.3)	337 (7.4)	7 (0.2)	4,556 (100.0)	12	106	4,674
記載なし	65 (%) (29.5)	30 (13.6)	8 (3.6)	1 (0.5)	3 (1.4)	52 (23.6)	33 (15.0)	28 (12.7)		220 (100.0)	1	2,036	2,257
総計	2,017 (%) (42.2)	472 (9.9)	118 (2.5)	5 (0.1)	57 (1.2)	1,278 (26.8)	457 (9.6)	365 (7.6)	7 (0.1)	4,776 (100.0)	13	2,142	6,931
平均	2.14	3.97	3.02	6.06	1.67	2.48	3.78	3.34	4.14	2.67	1.56	1.39	2.64
標準偏差	2.14	3.70	3.69	5.82	1.65	2.16	2.98	3.07	2.80	2.63	1.44	1.38	2.62

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5223##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査