

表 1415 使用透析液の種類 原疾患別 (腹膜透析単独患者)

原疾患	1.5%液のみ (イコデキストリンなし)	1.5%液と 2.5%液の併用 (イコデキストリンなし)	2.5%液のみ (イコデキストリンなし)	4.25%液のみ (イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独 (ブドウ糖使用なし)	1.5%液+ イコデキストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコデキストリン	2.5%液+ イコデキストリン	4.25%液+ イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計	
慢性系球体腎炎 (%)	623 (44.2)	156 (11.1)	32 (2.3)		12 (0.9)	354 (25.1)	138 (9.8)	94 (6.7)		1,409 (100.0)	5	596	2,010	
慢性腎孟腎炎 (%)	27 (45.8)	6 (10.2)	2 (3.4)	2 (3.4)		15 (25.4)	5 (8.5)	2 (3.4)		59 (100.0)		22	81	
急速進行性系球体腎炎 (%)	11 (28.9)	6 (15.8)	1 (2.6)		1 (2.6)	8 (21.1)	7 (18.4)	3 (7.9)	1 (2.6)	38 (100.0)		15	53	
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	7 (50.0)	2 (14.3)	1 (7.1)				1 (7.1)	3 (21.4)				3	17	
その他の分類不能の腎炎 (%)	15 (39.5)	7 (18.4)	1 (2.6)			9 (23.7)	4 (10.5)	2 (5.3)		38 (100.0)		16	54	
多発性囊胞腎 (%)	85 (53.8)	12 (7.6)				41 (25.9)	11 (7.0)	8 (5.1)	1 (0.6)	158 (100.0)	1	69	228	
腎硬化症 (%)	294 (44.4)	50 (7.6)	17 (2.6)		15 (2.3)	180 (27.2)	54 (8.2)	52 (7.9)		662 (100.0)	2	279	943	
悪性高血圧 (%)	31 (52.5)	2 (3.4)	1 (1.7)			1 (1.7)	13 (22.0)	5 (8.5)	6 (10.2)		59 (100.0)	1	27	87
糖尿病性腎症 (%)	560 (36.7)	144 (9.4)	37 (2.4)			21 (1.4)	469 (30.7)	154 (10.1)	142 (9.3)		1,527 (100.0)	3	717	2,247
SLE腎炎 (%)	10 (34.5)	2 (6.9)	3 (10.3)				5 (17.2)	7 (24.1)	2 (6.9)		29 (100.0)		17	46
アミロイド腎 (%)	4 (40.0)		1 (10.0)				3 (30.0)	2 (20.0)			10 (100.0)		4	14
痛風腎 (%)	5 (50.0)	2 (20.0)					1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)		10 (100.0)		5	15
先天性代謝異常による腎不全 (%)	3 (25.0)	3 (25.0)	1 (8.3)				4 (33.3)	1 (8.3)			12 (100.0)		3	15
腎・尿路結核 (%)												1	1	
腎・尿路結石 (%)	6 (50.0)					3 (25.0)		3 (25.0)		12 (100.0)		5	17	
腎・尿路腫瘍 (%)	4 (50.0)		2 (25.0)			2 (25.0)				8 (100.0)		1	9	
閉塞性尿路障害 (%)	8 (57.1)	2 (14.3)				2 (14.3)	1 (7.1)	1 (7.1)		14 (100.0)		3	17	
骨髄腫 (%)	1 (16.7)		1 (16.7)				1 (16.7)	3 (50.0)			6 (100.0)		1	7
腎形成不全 (%)	17 (48.6)	6 (17.1)	5 (14.3)	1 (2.9)		2 (5.7)	2 (5.7)	2 (5.7)		35 (100.0)		23	58	
不明 (%)	239 (48.4)	43 (8.7)	11 (2.2)	1 (0.2)	4 (0.8)	118 (23.9)	50 (10.1)	28 (5.7)		494 (100.0)	1	241	736	
再導入 (%)	14 (36.8)	5 (13.2)				9 (23.7)	5 (13.2)	5 (13.2)		38 (100.0)		12	50	
その他 (%)	53 (36.8)	24 (16.7)	2 (1.4)	1 (0.7)	3 (2.1)	40 (27.8)	8 (5.6)	8 (5.6)	5 (3.5)	144 (100.0)		82	226	
合計 (%)	2,017 (42.2)	472 (9.9)	118 (2.5)	5 (0.1)	57 (1.2)	1,278 (26.8)	457 (9.6)	365 (7.6)	7 (0.1)	4,776 (100.0)	13	2,142	6,931	
記載なし (%)														
総計 (%)	2,017 (42.2)	472 (9.9)	118 (2.5)	5 (0.1)	57 (1.2)	1,278 (26.8)	457 (9.6)	365 (7.6)	7 (0.1)	4,776 (100.0)	13	2,142	6,931	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5224##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査