

表 1416 使用透析液の種類 医療機関別 (腹膜透析単独患者)

医療機関	1.5%液のみ (イコテキストリンなし)	1.5%液と2.5%液の併用 (イコテキストリンなし)	2.5%液のみ (イコテキストリンなし)	4.25%液のみ (イコテキストリンなし)	イコテキストリン単独 (ブドウ糖使用なし)	1.5%液+イコテキストリン	1.5%液+2.5%液+イコテキストリン	2.5%液+イコテキストリン	4.25%液+イコテキストリン	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	128	21	3		5	97	26	20		300		189	489
(%)	(42.7)	(7.0)	(1.0)		(1.7)	(32.3)	(8.7)	(6.7)		(100.0)			
私立大学	311	51	12		6	133	45	38		596	6	354	956
(%)	(52.2)	(8.6)	(2.0)		(1.0)	(22.3)	(7.6)	(6.4)		(100.0)			
国立病院機構等	71	9	4		1	50	19	15	4	173		38	211
(%)	(41.0)	(5.2)	(2.3)		(0.6)	(28.9)	(11.0)	(8.7)	(2.3)	(100.0)			
縣市町村立・国保	386	90	24	3	10	267	83	68	3	934	2	385	1,321
(%)	(41.3)	(9.6)	(2.6)	(0.3)	(1.1)	(28.6)	(8.9)	(7.3)	(0.3)	(100.0)			
JCHO(旧社会保険)等	75	12	3		8	41	8	7		154		298	452
(%)	(48.7)	(7.8)	(1.9)		(5.2)	(26.6)	(5.2)	(4.5)		(100.0)			
厚生連等	111	41	13		4	96	37	23		325		129	454
(%)	(34.2)	(12.6)	(4.0)		(1.2)	(29.5)	(11.4)	(7.1)		(100.0)			
その他公的	332	56	19		9	252	67	53		788		306	1,094
(%)	(42.1)	(7.1)	(2.4)		(1.1)	(32.0)	(8.5)	(6.7)		(100.0)			
私立総合	92	43	8		2	43	27	23		238		39	277
(%)	(38.7)	(18.1)	(3.4)		(0.8)	(18.1)	(11.3)	(9.7)		(100.0)			
私立	368	119	29	2	5	221	107	95		946	2	328	1,276
(%)	(38.9)	(12.6)	(3.1)	(0.2)	(0.5)	(23.4)	(11.3)	(10.0)		(100.0)			
私立診療所	143	30	3		7	78	38	23		322	3	76	401
(%)	(44.4)	(9.3)	(0.9)		(2.2)	(24.2)	(11.8)	(7.1)		(100.0)			
総計	2,017	472	118	5	57	1,278	457	365	7	4,776	13	2,142	6,931
(%)	(42.2)	(9.9)	(2.5)	(0.1)	(1.2)	(26.8)	(9.6)	(7.6)	(0.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5225##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査