

表 1417 一日透析液使用量(L/日) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	156 (4.7)	322 (9.8)	814 (24.7)	1,238 (37.5)	700 (21.2)	53 (1.6)	16 (0.5)	3,299 (100.0)	1,674	4,973	5.71	2.06
腹膜透析 (APD) (%)	61 (3.4)	98 (5.5)	301 (16.9)	565 (31.8)	450 (25.3)	201 (11.3)	102 (5.7)	1,778 (100.0)	859	2,637	7.36	3.18
腹膜透析 (CCPD) (%)	9 (1.3)	19 (2.8)	51 (7.5)	194 (28.7)	199 (29.4)	121 (17.9)	84 (12.4)	677 (100.0)	328	1,005	8.56	3.00
合計 (%)	226 (3.9)	439 (7.6)	1,166 (20.3)	1,997 (34.7)	1,349 (23.4)	375 (6.5)	202 (3.5)	5,754 (100.0)	2,861	8,615	6.56	2.77
記載なし (%)												
総計 (%)	226 (3.9)	439 (7.6)	1,166 (20.3)	1,997 (34.7)	1,349 (23.4)	375 (6.5)	202 (3.5)	5,754 (100.0)	2,861	8,615	6.56	2.77

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##D5310##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査