

表 1418 一日透析液使用量(L/日) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独	198 (%)	419 (9.0)	1,087 (23.2)	1,630 (34.8)	976 (20.9)	242 (5.2)	129 (2.8)	4,681 (100.0)	2,250	6,931	6.27	2.72
PD.HD併用週1HD(F)	24 (%)	17 (2.5)	59 (1.8)	320 (6.2)	343 (33.6)	126 (13.2)	63 (6.6)	952 (100.0)	544	1,496	7.91	2.62
PD.HD併用週2HD(F)	4 (%)	3 (4.7)	17 (3.5)	30 (20.0)	19 (35.3)	5 (22.4)	7 (5.9)	85 (8.2)	35	120	6.95	3.12
PD.HD併用週3HD(F)												
PD.HD併用週4HD(F)												
PD.HD併用その他			3 (8.6)	16 (45.7)	11 (31.4)	2 (5.7)	3 (8.6)	35 (100.0)	14	49	7.53	2.06
合計	226 (%)	439 (7.6)	1,166 (20.3)	1,996 (34.7)	1,349 (23.4)	375 (6.5)	202 (3.5)	5,753 (100.0)	2,843	8,596	6.56	2.77
不明				1 (100.0)				1 (100.0)	3	4	6.50	
記載なし									15	15		
総計	226 (%)	439 (7.6)	1,166 (20.3)	1,997 (34.7)	1,349 (23.4)	375 (6.5)	202 (3.5)	5,754 (100.0)	2,861	8,615	6.56	2.77

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5311##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査