

表 1419 一日透析液使用量(L/日) 性別 (腹膜透析患者)

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	139	220	653	1,225	1,029	294	177	3,737	1,865	5,602	6.91	2.89
(%)	(3.7)	(5.9)	(17.5)	(32.8)	(27.5)	(7.9)	(4.7)	(100.0)				
女性	87	219	513	772	320	81	25	2,017	996	3,013	5.90	2.42
(%)	(4.3)	(10.9)	(25.4)	(38.3)	(15.9)	(4.0)	(1.2)	(100.0)				
合計	226	439	1,166	1,997	1,349	375	202	5,754	2,861	8,615	6.56	2.77
(%)	(3.9)	(7.6)	(20.3)	(34.7)	(23.4)	(6.5)	(3.5)	(100.0)				
記載なし												
(%)												
総計	226	439	1,166	1,997	1,349	375	202	5,754	2,861	8,615	6.56	2.77
(%)	(3.9)	(7.6)	(20.3)	(34.7)	(23.4)	(6.5)	(3.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5312##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査